

1

Ви працюєте на ФАПі в кабінеті профілактичних щеплень. У 4х місячної дитини після введення ІІ АКДП раптово виникли симптоми анафілактичного шоку. З введення якого препарату Ви почнете надавати невідкладну допомогу?

- A** *Р-н адреналіну гідрохлориду 0,1% 0,1 мл.
- B** Р-н анальгін 50% 0,1мл.
- C** Р-н сібазону 0,5% 0,3 мл.
- D** Р-н аміназину 2,5% 0,2 мл.
- E** Р-н кальцію глюконату 10% 1,0 мл.

2

Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?

- A** 2,2-2,5 ммоль/л
- B** 1-1,5 ммоль/л
- C** 1,75-2,0 ммоль/л
- D** 2,5-2,75 ммоль/л
- E** 2,75-3,0 ммоль/л

3

Яка з функцій шкірних покривів у новонародженого розвинена найгірше?

- A** терморегуляторна
- B** дихальна
- C** пігментоутворююча
- D** резорбційна
- E** регенераторна

4

Які з придатків шкіри при народженні дитини недорозвинені?

- A** потові залози
- B** Нігті
- C** Сальні залози
- D** пушкове волосся між лопатками
- E** вій на повіках очей

5

У дитини 2 років температура 38°C, вологий кашель, задишка змішаного типу, в'ялість, розлад сну, тахікардія. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Такі симптоми визначають при:

- A** *гострій пневмонії
- B** гострому ларингіті
- C** назофарингіті
- D** бронхіальній астмі
- E** гострому бронхіті

6

Дитина 4 років захворіла раптово, з'явився сухий кашель, свистячий видих, який чути на відстані, в акті дихання участь допоміжних м'язів. Визначте діагноз:

- A** *бронхіальна астма
- B** гострий бронхіт
- C** гострий ларингіт
- D** назофарингіт
- E** гостра пневмонія

- Головним чинником ризику розвитку бронхіальної астми є:
- A** *алергічні захворювання, що передаються по спадковості
 - B** неефективне лікування пневмоній
 - C** септичні захворювання шкіри
 - D** дисбактеріоз
 - E** хронічні вогнища інфекції

8

- У дитини з раннього віку спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:
- A** *природженій ваді серця
 - B** вегето-судинній дистонії
 - C** ревматизмі
 - D** малій хорей
 - E** інфекційному міокардиті

9

- Для якого захворювання є характерним ниючий тупий біль у ділянці правого підребір'я з іррадіацією в праву лопатку?
- A** *хронічного холецистити
 - B** хронічного гастриту
 - C** хронічного коліту
 - D** хронічного панкреатиту
 - E** виразкової хвороби

10

- Дитина 5 років захворіла гостро, через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок симетрично розташовані, дрібні, геморагічно-папульозні висипи, які скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:
- A** *геморагічний васкуліт, шкірна форма
 - B** хвороба Верльгофа
 - C** кір
 - D** геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
 - E** гемофілія

11

- Клінічна картина гострого пієлонефриту характеризується у дітей наявністю:
- A** *піурії
 - B** ціанозу шкіри
 - C** головним болем
 - D** глюкозурією
 - E** носовою кровотечею

12

- Дівчина 12 років одержує інсулін, порушила дієту і стан погіршився. Шкіра бліда суха, гіпотонус м'язів, запах ацетону з рота, посилення діурезу. Визначте діагноз:
- A** *гіперглікемічний стан
 - B** гіпоглікемічний стан
 - C** печінкова кома
 - D** уремічна кома
 - E** анафілактичний шок

13

У дитини 3-х місяців асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5x5 см. Симптоми вказують на:

- A** *рахіт
- B** гіпервітаміноз Д
- C** алергічний діатез
- D** спазмофілію
- E** гіпотрофію

14

Загальний стан дитини дуже важкий, температура 39,5°C, повторні блювання, на шкірі тулуба з'являються елементи геморагічного висипу, які мають "зірчасту форму".

Встановіть діагноз.

- A** *менінгококцемія
- B** вітряна віспа
- C** кір
- D** дифтерія
- E** скарлатина

15

Енантеми, плями Філатова-Копліка-Бельського на слизовій оболонці рота, етапність появи плямисто-папульозного висипу — симптоми, які вказують на:

- A** *кір
- B** скарлатину
- C** менінгококову інфекцію
- D** вітряну віспу
- E** краснуху

16

Мікрофлора кишечника дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні переважно складається з:

- A** *Біфідо-бактерій
- B** Кишкової палички
- C** Стрептококів
- D** Стафілококів
- E** Дріжджової мікрофлори

17

У новонародженої дівчинки на 2-гу добу життя з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають звичайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Для якого стану характерні дані симптоми:

- A** *Фізіологічної жовтяниці новонароджених
- B** Гемолітичної хвороби новонароджених
- C** Обтураційної жовтяниці
- D** Вірусного гепатиту
- E** Аномалій розвитку гепатобіліарної системи

18

Згідно календаря профілактичних щеплень у віці 12 місяців дитині проводять вакцинацію проти:

- A** *Кору, краснухи, паротиту
- B** Гемофільної інфекції
- C** Туберкульозу
- D** Вірусного гепатиту В
- E** Поліомієліту

19

Згідно призначень лікаря, новонародженій дитині з ознаками метеоризму Ви ввели газовивідну трубку. На який час можна залишити введену трубку:

- A** *20-30 хвилин
- B** 5-10 хвилин
- C** 2-3-хвилини
- D** 1 годину
- E** 2 години

20

Вкажіть препарат, який необхідно ввести дитині при анафілактичному шоці:

- A** *Преднізолон
- B** Корглікон
- C** Еуфілін
- D** Фуросемід
- E** Седуксен

21

У стаціонар поступила дівчинка 8 років з підозрою на гострий гломерулонефрит. Які зміни в сечі найбільш характерні для даного захворювання:

- A** *Протеїнурія, гематурія
- B** Лейкоцитурія, гематурія
- C** Глюкозурія
- D** Бактеріурія
- E** Ацетонурія, протеїнурія

22

Воду якої температури Ви підготуєте для промивання шлунку дитині 5 років з гострим гастритом?

- A** 20-24°C
- B** 26-28°C
- C** 16-20°C
- D** 36-37°C
- E** 24-28°C

23

З диспансерного обліку дітей з виразковою хворобою шлунку можна знімати через:

- A** *5 років повної ремісії
- B** 2 роки повної ремісії
- C** 6 місяців повної ремісії
- D** 1 рік повної ремісії
- E** 3 роки повної ремісії

24

Згідно призначень лікаря, Ви повинні ввести антитоксичну протидифтерійну сироватку за методом Безредко. В якому розведенні Ви зробите першу ін'єкцію і який оберете шлях введення:

- A** *1:100, внутрішньошкірно
- B** Нерозведену, внутрішньошкірно
- C** Нерозведену, підшкірно
- D** 1:100, підшкірно
- E** 1:100, внутрішньом'язово

25

Вкажіть початкову дозу інсуліну для надання невідкладної допомоги дитині з діабетичною комою:

- A** *0,1-0,2 ОД/кг
- B** 0,5 ОД/кг
- C** 0,3-0,5 ОД/кг

- D* 5,0 ОД/кг
- E* 2,0 ОД/кг

26

Які показники гемоглобіну у дітей характерні для анемії середньої ступені важкості:

- A* *70-90 г/л
- B* 90-100 г/л
- C* 70-50 г/л
- D* 90-110 г/л
- E* 60-80 г/л

27

У дівчинки молодшої групи дитячого садочку діагностовано вітряну віспу. На який термін необхідно ізолювати контактних дітей:

- A* *21 день
- B* 7 днів
- C* 5 днів
- D* 10 днів
- E* 17 днів

28

Вкажіть, з якої маніпуляції розпочинається невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності:

- A* *Санації верхніх дихальних шляхів
- B* Оксигенотерапії
- C* Відволікаючої терапії
- D* Інфузійної терапії
- E* Введення еуфіліну

29

Вкажіть захворювання, яке супроводжується різким погіршенням загального стану, збудженістю, вимушеним сидячим положенням, експіраторною задишкою:

- A* *Бронхіальна астма
- B* Стенозуючий ларинготрахеїт
- C* Бронхіоліт
- D* Кашлюк
- E* Гостра пневмонія

30

Назвіть захворювання, яке розвивається на першому тижні життя, характеризується наявністю пустул розміром 0,5 см, заповнених серозним прозорим або каламутним вмістом:

- A* *Везикулопустульоз
- B* Попрілості
- C* Алергічний дерматит
- D* Краснуха
- E* Скарлатина

31

До групи ризику по бронхіальній астмі відносяться діти з:

- A* *Атопічним дерматитом
- B* Захворюваннями нирок
- C* Цукровим діабетом
- D* Захворюваннями шкіри
- E* Ревматизмом

32

З якого препарату доцільно розпочати лікування ревматизму:

- A** *Антибіотиків
- B** Еуфіліну
- C** Серцевих глікозидів
- D** Сечогінних
- E** Вітамінів

33

У дитини 2 років погіршення апетиту. При огляді шкіра та слизові оболонки бліді. В загальному аналізі крові еритроцитів $2,7 \times 10^{12}$, гемоглобін - 85 г/л. Яке захворювання можна діагностувати за даними симптомами?

- A** * Анемія
- B** Гострий лейкоз
- C** Геморагічний васкуліт
- D** Гемофілія
- E** Тромбоцитопенічна пурпура

34

У дівчинки 5 років скарги на зниження апетиту, слабкість, млявість. При огляді: шкіра бліда, набряки на обличчі, АТ 130/80 мм рт ст., сеча кольору "м'ясних помий". Який метод лабораторної діагностики повинна провести акушерка для визначення видільної та концентраційної функції нирок.

- A** *Аналіз сечі за Зимницьким
- B** Загальний аналіз сечі
- C** Аналіз сечі за Нечипоренком
- D** Аналіз сечі за Амбурже
- E** Аналіз сечі за Аддісом -Каковським

35

Лікар призначив дитині дослідження сечі за Нечипоренком. Яку порцію сечі необхідно зібрати для виконання цього дослідження?

- A** *Середню порцію ранкової сечі
- B** Всю ранкову сечу
- C** Нічну порцію сечі
- D** Добову сечу
- E** Любу порцію сечі

36

Дитина народилася з масою тіла 3800 г. Дитині з 4-х тижневого віку треба проводити профілактику рахіту. Що акушерка буде використовувати для специфічної профілактики рахіту у дітей?

- A** *Вітамін Д₃
- B** Вітамін Е
- C** Вітамін А
- D** Вітамін С
- E** Прогулянки на свіжому повітрі.

37

При проведенні патронажу до новонародженої дитини, акушерка відмітила серозні виділення з пупкової ранки. Шкіра навколо пупка не змінена. Загальний стан дитини не порушений. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** *Катаральний омфаліт
- B** Флегмонозний омфаліт
- C** Сепсис
- D** Пупкова грижа

E Попрілості

38

У дитини 2 років , на фоні ГРВІ, акушерка ФАПу відмітила неспокій, “гавкаючий кашель”, захриплість голосу, задишка, блідість шкіри. Вкажіть яке ускладнення, розвинулося у дитини?

- A** *Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- B** Гострий назофарингіт
- C** Обструктивний бронхіт
- D** Пневмонія
- E** Тонзиліт

39

У новонародженої дитини акушерка помітила ціаноз, який посилюється при крику, прийманні їжі. З анамнезу відомо, що мати дитини перехворіла грипом на 10 тижні вагітності. Для якої патології притаманні ці симптоми?

- A** *Природжена вада серця
- B** Вогнищева пневмонія
- C** Асфіксія новонародженого
- D** Пологова травма
- E** Анемія

40

У 12 -ти річної дитини через 2 тижні після перенесеної ангіни з'явився біль у серці, блідість шкіри, слабкість, втомлюваність, тахікардія, тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Яку патологію може запідозрити акушерка ФАПу?

- A** *Ревмокардит
- B** Вроджену ваду серця
- C** Анемію
- D** Вегето-судинну дистонію
- E** Вогнищеву пневмонію

41

Хлопчик 13-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу виразкової хвороби шлунка. Який метод діагностики даного захворювання акушерка ФАПу розцінює як головний?

- A** *Фіброгастродуоденоскопія
- B** Фракційне зондування
- C** Рентген обстеження
- D** Дуоденальне зондування
- E** Копрологічне обстеження

42

У дитини 5-ти місяців після ведення в раціон 100г овочевого пюре з'вились рідкі випорожнення жовтого кольору з білими грудочками та слизом в кількості 5 – 6 разів на добу, одноразова блювота. Лікар призначив водно-чайну паузу. Яким розчином акушерка буде її проводити ?

- A** *Розчином регідрону
- B** Розчином фурациліну
- C** Фруктовим соком
- D** 40% розчином глюкози
- E** відваром кропиви

43

Акушерка у новонародженої дівчинки виявила крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Що з дитиною?

- A** *Кефалогематома
- B** Пологова пухлина
- C** Внутрішньочерепнапологова травма
- D** Пухирчатка новонародженого
- E** Водянка мозку

44

За 5 днів життя недоношена дитина втратила 10% маси, патологічних змін немає. Вкажіть причини такого стану.

- A** *Фізіологічна втрата маси тіла
- B** Фізіологічна жовтяниця
- C** Транзиторний катар кишок
- D** Статевий криз
- E** Фізіологічна ерітема

45

Які рекомендації повинна надати акушерка матері доношеної новонародженої дитини, щодо частоти прикладання до грудей?

- A** *Годувати за вимогою новонародженого
- B** Годувати 10 разів на добу
- C** Годувати 7 разів на добу
- D** Годувати 6 разів на добу
- E** Годувати 5 разів на добу

46

Мати дитини 5 місяців поскаржилась, що останнім часом дитина стала неспокійною, погано спить. Акушерка з'ясувала, що за останній місяць вона набрала 500 г маси тіла. Яке обстеження необхідно провести?

- A** *Контрольне зважування
- B** Вимірювання обводу грудної клітини
- C** Вимірювання зросту
- D** Вимірювання обводу голови
- E** Вимірювання температури тіла

47

Дитина народилася від 1 вагітності, фізіологічних пологів з масою тіла 3 200 г, з ростом 49 см. За шкалою Апгар – 9 б. При огляді: дитина здорова, $t = 36,5^{\circ}\text{C}$. Які щеплення повинна провести акушерка дитині у пологовому будинку?

- A** *Проти гепатиту В, туберкульозу
- B** Проти кашлюку, дифтерії
- C** Проти поліомієліту, гемофільної інфекції
- D** Проти кору, краснухи
- E** Проти правцю, дифтерії

48

У дитини 3-х років підвищилася температура тіла до 38°C . На шкірі волосяної частини голови, обличчя, губах з'явилася везикулярна висипка. Такий стан характерний для:

- A** *Вітряна віспа
- B** Кір
- C** Краснуха
- D** Скарлатина
- E** Менінгокова інфекція

49

Ви працюєте акушеркою в пологовій залі, здійснюєте контакт "шкіра до шкіри" здорової новонародженої дитини з матір'ю. Такий контакт триває:

- A** *2 години.
- B** 1 годину.
- C** До початку годування.
- D** До вимірювання t тіла новонародженого.
- E** До обробки пуповини.

50

На амбулаторному прийомі дитина, яка може самостійно сидіти і стояти біля опори, голосно повторювати різні склади. Нервово-психічний розвиток дитини відповідає віку:

- A** *8 місяців
- B** 6 місяців
- C** 5 місяців
- D** 4 місяці
- E** 12 місяців

51

Дитині 6 місяців. Підберіть продукт першого прикорму.

- A** *Овочеve пюре з одного овоча
- B** Овочеve пюре з різних овочів.
- C** Вівсяна каша на молоці
- D** Яєчний жовток.
- E** Суміш NAN.

52

Дитині 4-ри місяці. У неї підвищена пітливість, неспокійний сон. Лікарем поставлено діагноз: рахіт, початковий період. Для специфічного лікування рахіту необхідно призначити:

- A** *Аквадетрим.
- B** ЛФК, масаж.
- C** Раціональне харчування.
- D** Дезінтоксикаційна терапія.
- E** Призначення водних процедур.

53

Дитині 10-ти місяців. Мати вигодовувала дитину коров'ячим молоком та манною кашею. В аналізі крові: Hb - 90 г/л. Лікарем поставлено діагноз: анемія. Визначіть чинник, який сприяв розвитку анемії у дитини.

- A** *Одноманітне вуглеводне годування.
- B** Раннє введення фруктових соків.
- C** Зниження загального опору організму.
- D** Дія алергенів.
- E** Гормональні порушення.

54

Дитині 3 роки. Скарги матері на підвищення температури тіла до 38°C, відсутність апетиту, нудоту, біль в животі, часті болісні сечовипускання, сеча каламутна. Лікарем призначена проба сечі за Нечипоренком. Сутність даної проби полягає в:

- A** *Визначення кількості лейкоцитів та еритроцитів в 1 мл сечі
- B** Визначення ацетону в сечі
- C** Визначення кальцію сечі
- D** Визначення цукру в сечі
- E** Визначення кількості сечі за добу

55

У дитини 5 років температура 39,5°C, головний біль, катаральні явища в носоглотці, з'явилися судоми. Вашими першочерговими діями будуть:

- A** *Введення літичної суміші
- B** Ввести розчин адреналіну
- C** Ввести серцеві засоби
- D** Ввести гормони
- E** Ввести розчин глюкози внутрішньовенно

56

Мати дитини 2-х років цікавиться, яким дітям проводять хіміопротекцію туберкульозу .

- A** *з віражем туберкулінової проби
- B** з негативною пробою Манту
- C** часто хворіючим дітям
- D** зі скаргами на слабкість, блідість, схуднення, підвищення t тіла
- E** з порушеннями дихання

57

Дитині 2 роки. Лікарем встановлено діагноз: кашлюк. Найчастішими ускладненнями кашлюку у дітей раннього віку можуть бути:

- A** *Пневмонія.
- B** Анемія.
- C** Ангіна.
- D** Бронхіальна астма.
- E** Несправжній круп.

58

У дитини 12-ти років скарги на спрагу, часті сечовипускання, підвищений апетит та схуднення. Ці симптоми вказують на:

- A** *Цукровий діабет.
- B** Пієлонефрит.
- C** Анемія.
- D** Хронічний гастрит.
- E** Туберкульоз.

59

У дитини 3-х років скарги на болі в животі, нестійкі випорожнення, свербіж в ділянці заднього проходу. Першочерговим дослідженням повинно бути:

- A** *Зіскоб з періональних складок.
- B** Бактеріологічний посів кала.
- C** Кал на яйця гельмінтів.
- D** Копрологічне дослідження
- E** Зондування шлунку.

60

У дитини першого року життя важкий стан, дефіцит маси тіла 30%, шкіра із сіруватим відтінком, зморшкувата, виникають диспептичні розлади. Що може обумовити такий стан?

- A** *Гіпотрофія III ступеня.
- B** Гіпотрофія II ступеня.
- C** Гастрит.
- D** Анемія.
- E** Вроджена вада серця.

61

Після проведення щеплення дитині 12 місяців, необхідно заповнити наступну медичну документацію:

- A** *Форма 112/0, Форма 063/0;
- B** Форма 097/0, Форма 063/0;

- C* Журнал обліку використання вакцини;
- D* Журнал реєстрації проби Манту;
- E* Історію хвороби дитини.

62

Після вживання полуниці у дитини на шкірі тулуба та обличчі з'явилася плямисто-папульозна висипка, свербіж, підвищення температури тіла до 38°C. Що необхідно зробити?

- A* *Ввести глюкокортикостероїди.
- B* Застосувати знеболюючі препарати.
- C* Ввести сечогінні препарати.
- D* Застосувати антибіотики.
- E* Госпіталізувати до відділення.

63

Акушерка навчає матір новонародженої дитини щодо догляду за пуповинним залишком. Виберіть найбільш доцільну рекомендацію:

- A* Підтримувати пуповинний залишок завжди сухим та чистим
- B* Накривати пуповинний залишок підгузниками
- C* Обробляти пуповинний залишок 1% р – м діамантового зеленого
- D* Накладати стерильну пов'язку
- E* Обробляти пуповинний залишок 96° розчином етилового спирту

64

Дитина 9-и місяців вигодовувалась молочними сумішами, з прикормів отримує манну кашу. Яке дослідження треба запланувати дитині з метою виявлення анемії?

- A* *Аналіз крові загальний
- B* Аналіз сечі загальний
- C* Копрограму
- D* Зіскоб на ентеробіоз
- E* Мазок із зів'язку на флору

65

Ви прийшли на активний патронаж до новонародженої дитини 10 днів. На шкірі з'явилась пітниця. Які симптоми на це вкажуть?

- A* *Дрібно-крапкові висипання на шиї
- B* Блідість шкіри та слизових оболонок
- C* Акроціаноз кінцівок
- D* Гіперемія в пахових складках
- E* Затруднене носове дихання

66

Мати проводить підготовку дитини до годування груддю, виявила утруднене носове дихання, пов'язане з великою кількістю слизу. Чим потрібно промити носові ходи?

- A* *Фізіологічним розчином
- B* Нафтізином
- C* Галазоліном
- D* Ефедрином
- E* Соком алое

67

Дитина народилася в строк з вагою 3200 г та зростом 52 см, здорова. Коли акушерка планує прикласти новонароджену дитину до грудей матері вперше?

- A* *Протягом 30 хв. після народження
- B* Через 2 години
- C* Після переведення матері і дитини в палату для сумісного перебування

D Через 12 годин

E На другий день після народження

68

Консультативний прийом в кабінеті "Здорова дитина". Дайте відповідь на запитання батьків:., В якому віці дитина починає самостійно сидіти?"

A *6 місяців

B 8 місяців

C 9 місяців

D 10 місяців

E 11 місяців

69

Ви проводите патронажне відвідування новонародженої дитини, даєте рекомендації матері щодо грудного вигодовування. Що з нижчеперерахованого належить до принципів успішного грудного вигодовування?

A *Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини

B Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди

C Новонароджених годують 5 разів на добу

D Вночі новонароджених дітей не годують [перерва 8 годин]

E Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування

70

У дитини 2-х місяців у пахвинній ділянці спостерігається гіперемійована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?

A *Попрілості III ступеня

B Везикулопустульоз

C Пітниця

D Попрілості I ступеня

E Пухирчатка новонародженого

71

У хлопчика 5-ти років спостерігаються періодичні блювання, нічні жахи, емоційна нестійкість. Об'єктивно: хлопчик пониженого харчування, астеничної тілобудови, інтелектуально добре розвинутий. В сечі - ацетон +++. Ця клінічна картина характерна для діабезу:

A *Нервово-артритичного

B Геморагічного

C Ексудативно-катарального

D Алергічного

E Лімфатико-гіпопластичного

72

Дитина 12 років з підозрою на хронічний гастрит звернулася до дитячої лікарні. До якого обстеження треба готувати цю дитину?

A *Фіброгастродуоденоскопії

B Дуоденального зондування

C Ультразвукового дослідження органів черевної порожнини

D Флюорографії

E Колоноскопії

73

У дівчинки 4 років, що відвідує дитячий садок, з'явилась дратівливість, нічне нетримання сечі, свербіж в періанальній ділянці. Ці проблеми найбільш вірогідні для:

A *Ентеробіозу

B Аскаридозу

- C* Трихоцефальозу
- D* Гіменоліпедозу
- E* Трихінельозу

74

У дівчинки 7-ми років скарги на періодичний ниючий біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання. В сечі: лейкоцити - 16 в полі зору. Яку патологію можна запідозрити в даному випадку?

- A* *Інфекцію сечовивідних шляхів
- B* Гострий вагініт
- C* Гострий гломерулонефрит
- D* Гострий проктит
- E* Енурез

75

Під час патронажу дитини, яка народилась 5 днів тому, Ви помітили легкий акроціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей. У матері дитини у перші місяці вагітності діагностовано токсоплазмоз. Яка хвороба може бути у дитини?

- A* *Природжена вада серця
- B* Пневмонія
- C* Спазмофілія
- D* Рахіт
- E* Асфіксія

76

Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив проведення щеплення проти гепатиту В. Які ще щеплення проводять новонародженим у пологовому будинку?

- A* *БЦЖ на 3-й день
- B* Проти кору, краснухи на 3-й день
- C* Проти поліомієліту на 3-й день
- D* Проти дифтерії на 2-й день
- E* Проти епідемічного паротиту в 1-й день

77

Мати дитини 3-х місяців скаржиться на неспокій дитини, здуття живота, зниження апетиту. Патронажна медсестра пояснила матері, що у дитини метеоризм. Для зменшення метеоризму вона порекомендувала використовувати:

- A* *Кропову воду
- B* Коров'яче молоко
- C* Некип'ячену воду
- D* Фруктовий сік
- E* Солодку воду

78

До Вас звернулася мати з дитиною 6 років зі скаргами на непостійний біль у животі, навколо пупка, нудоту, зниження апетиту, висип на шкірі у вигляді кропив'янки. Яке обов'язкове обстеження Ви порекомендуєте?

- A* *Кал на яйця гельмінтів
- B* Кал на стеркобілін
- C* Кал на бактеріологічне дослідження
- D* Кал на копрологію
- E* Кал на приховану кров

79

У дитини 10 років, що захворіла на гострий гломерулонефрит і має проблеми: зменшення

кількості виділеної сечі за добу, підвищення артеріального тиску, набряки на обличчі. В гострий період дієта № 7 повинна бути:

- A** *Безсольова
- B** 1,5 г солі на добу
- C** 1-2 г солі на добу
- D** 3-5 г солі на добу
- E** 5 г солі на добу

80

Новонародженій дитині два дні. Під час сповивання акушерка помітила на шкірі кінцівок та тулуба окремі ділянки гіперемії та лущення. Як ви розцінюєте такий стан.

- A** * Фізіологічна еритема. Ретельний догляд за шкірою
- B** Сепсис. Лікування у відділенні патології новонароджених
- C** Везикулопустульоз. Хвору дитину ізолюють від здорових
- D** Ексудативно – катаральний діатез. Лікування у алерголога
- E** Токсична еритема. Лікування у відділенні патології новонароджених

81

Дитина народилася від II вагітності II нормальних пологів з масою 3100г, зростом 50 см. Вкажіть, яке щеплення необхідно зробити в перший день життя .

- A** * Проти вірусного гепатиту В
- B** Проти туберкульозу
- C** Проти дифтерії
- D** Проти епідемічного паротиту
- E** Проти кору

82

Одразу після народження над лівою тім'яною кісткою у новонародженого відмічається, флюктуруюча пухлина, яка не поширюється за межі однієї кістки. Про яку патологію це свідчить?

- A** * Кефалогематома
- B** Пологова пухлина
- C** Набрякова форма гемолітичної хвороби
- D** Гідроцефалія
- E** Абсцес

83

У перший день життя у новонародженої дитини спостерігається густі, в'язкі, темнозелені випорожнення. Оцініть їх.

- A** * Меконії
- B** Стул при дизентерії
- C** Кров'яний стул
- D** Стул при сальмонельозі
- E** Стул при вірусному гепатиті

84

При обстеженні на дому дитини 2,5 місяців акушерка звернула увагу на те, що дитина здригається при помірно сильних звуках, має підвищену пітливість, помірне облісіння волоссяної частини потилиці. Якому захворюванню відповідають ці ознаки?

- A** * Рахіт
- B** Пневмонія
- C** Обструктивний бронхіт
- D** Анемія
- E** Спазмофілія

85

На 5-й день після народження у дитини після сечовипускання на пелюшках залишається плями жовтувато-цегляного кольору. З чим це пов'язано?

- A** * Сечокислим інфектором нирок
- B** Мікрокістозом нирок
- C** Гідронефрозом
- D** Пухлиною нирок
- E** Гломерулонефритом

86

Дитина віком 2 місяці на природному вигодовуванні, добре набирає масу тіла. Фізичний розвиток відповідає віковій нормі. Мати самостійно дала дитині 10 мл яблучного соку.

Поясніть, до чого це може призвести.

- A** * до появи травних розладів
- B** до зневоднення
- C** до раннього нервово – психічного розвитку
- D** до порушень фізичного розвитку
- E** до порушень нервово – психічного розвитку

87

Хлопчик народився від перших пологів при терміні гестації 33 тижні, з масою тіла 1800 г, довжиною тіла – 40 см. Ви оцінили таку дитину наступним чином:

- A** * Недоношена
- B** Доношена
- C** Переношена
- D** Доношена із затримкою внутрішньоутробного розвитку
- E** Переношена із природженою гіпотрофією

88

Ви запросили матір з 6 – ти місячною дитиною на вакцинацію проти вірусного гепатиту В. Вкажіть дозу та спосіб введення вакцини.

- A** * 0,5 мл в/м в зовнішню поверхню стегна
- B** 0,5 мл п/ш в плече
- C** 0,1 мл в/ш в передпліччя
- D** 0,1 мл в/м в сідницю
- E** 1,0 мл п/ш в плече

89

Яку лікувальну ванну ви оберете для дітей з ексудативно-катаральним діатезом:

- A** * Черета, корінь дуба, аїра, крохмальні
- B** Морські ванни
- C** Радонові ванни
- D** Гігієнічні ванни
- E** Хвойні ванни

90

При профілактичному огляді дитини 2-х місяців, ви виявили прибавку у вазі за місяць 400 г, зі слів матері, кількість сечовипускань за добу не перебільшує 5. Ви розцінили це як:

- A** * Абсолютні ознаки недогодовування
- B** Перегодовування дитини
- C** Нормальні показники
- D** Індивідуальні особливості організму дитини
- E** Вплив навколишнього середовища

91

Ви медсестра дитячої поліклініки. У вас на дільниці ВІЛ-інфікована жінка народила дитину. ВІЛ статус дитини не визначено. Які профілактичні щеплення можна проводити

дитині до уточнення ВІЛ статусу?

- A** *АКДП
- B** БЦЖ
- C** Кір, краснуха, епідпаротит
- D** Поліомієліт перорально
- E** Проти вітряної віспи

92

Дитині 6 місяців, педіатр порекомендував ввести в раціон дитини овочевий прикорм. Мама поцікавилась у акушерки, чи готова дитина до цього. Дайте роз'яснення матері.

- A** *Дитина самостійно сидить, відкриває рот при піднесенні ложки до рота
- B** Промовляє 2 слова
- C** Відвертає голову від ложки з їжею
- D** Випльовує їжу не ковтаючи її
- E** Закриває рот при вигляді їжі

93

Які продукти харчування ви порекомендуєте з метою попередження розвитку залізодефіцитної анемії дитині першого року життя?

- A** *М'ясо, потім печінка, яєчний жовток, риба
- B** Овочеve пюре, фруктові соки
- C** Змішані каші з кількох круп
- D** Коров'яче або козяче молоко
- E** Протерті свіжі овочі та фрукти

94

Визначіть найбільш ефективний протигельмінтний препарат, який використовують для лікування глистних інвазій у дітей.

- A** *Ворміл
- B** Піперазин
- C** Пірантел
- D** Ентеросгель
- E** Піпольфен

95

Стан дитини порушений. Скарги на підвищення Т та кашель. Аускультативно в нижніх сегментах справа і зліва – велика кількість дрібно -пухирчастих хрипів. Які ще прояви виявимо у дитині?

- A** *Задишка змішаного типу
- B** Висипання в ротовій порожнині
- C** Висипання на шкірі
- D** Блідість носогубного трикутника
- E** Менінгіальні прояви

96

Вкажіть середній приріст маси тіла для дитини на 2-му місяці життя

- A** *800 г
- B** 400 г
- C** 500 г
- D** 600 г
- E** 700 г

97

Визначіть особливості введення вакцини БЦЖ новонародженій дитині.

- A** *Вводять 0,1 мл розведеної вакцини внутрішньошкірно
- B** Вводять 0,2 мл розведеної вакцини внутрішньошкірно

- C* Вводять 0,5 мл розведеної вакцини підшкірно
- D* Вводять 0,05 мг розведеної вакцини підшкірно
- E* Вводять 0,1 мл розведеної вакцини підшкірно

98

Визначіть положення дитини при приступі бронхіальної астми:

- A* *Вимушене – сидить, фіксує плечовий пояс
- B* Сидить із зігнутими колінами
- C* Лежить на животі
- D* Лежить на лівому боці
- E* Лежить, запрокинувши голову назад

99

Дитина 10 місяців неспокійна, перелякана. Шкіра бліда, ціанотичні кінцівки, дихання шумне, часте з утрудненим вдихом. Кашель гавкаючий, нападopodobний, голос втратив гучність. Яке захворювання у дитини?

- A* *Гострий стенозуючий ларингіт
- B* Гострий бронхіт
- C* Гострий фарингіт
- D* Гостра пневмонія
- E* Приступ бронхіальної астми

100

У якому випадку вигодовування через зонд буде основним методом годування?

- A* *Відсутність ковтального рефлексу
- B* кефалогематома
- C* омфаліт
- D* везикулопустульоз
- E* відсутність смоктального рефлексу

101

У новонародженого в перші години життя: порушене дихання, слабкий монотонний крик, ністагм, косоокість, тремор, порушене смоктання та ковтання. Яке захворювання можна запідозрити?

- A* *Внутрішньочерепна пологова травма
- B* Параліч Ерба
- C* Сепсис
- D* Анемію
- E* Гемолітична хвороба новонароджених

102

Коли проводять перше зважування доношеної новонародженої дитини?

- A* *У пологовій залі після контакту “шкіра до шкіри”
- B* У пологовій залі перед контактом “шкіра до шкіри”
- C* У пологовій залі після вимірювання температури тіла
- D* У пологовій залі перед прикладанням до грудей
- E* У палаті спільного перебування

103

У дитини 2–х років поганий апетит, слинотеча, на слизовій щік та губ білі бляшки, оточені червоним обідком запаленої слизової оболонки. Для якого захворювання характерні такі зміни?

- A* *Афтозний стоматит
- B* Пліснявка
- C* Кандидозний стоматит
- D* Кір

104

У дівчинки 4 років млявість, не збільшується маса тіла. Шкіра бліда, суха, лущиться, ламкість волосся, нігтів. У загальному аналізі крові знижена кількість гемоглобіну та еритроцитів. Такий стан діагностують при:

- A** *Анемії
- B** Гемофілії
- C** Гіпотрофії
- D** Лейкозі
- E** Ревматизмі

105

У хлопчика 6-ти років відзначається припухлість і болючість правого колінного суглоба. З анамнезу відомо, що раніше спостерігались періодичні кровотечі, які довго не припинялись, з'явилися масивні синці. У дідуся з боку матері теж були такі прояви. Яке найбільш ймовірне захворювання у хлопчика?

- A** *Гемофілія
- B** Тромбоцитопенічна пурпура
- C** Анемія
- D** Геморагічний васкуліт
- E** Лейкоз

106

У дитини 3-х місяців, що хворіє на рахіт батьки спостерігали напад ціанозу, короткочасну зупинку дихання, дитина вкрилася липким потом. Через 1 хвилину настав гучний вдих і стан нормалізувався. Вкажіть причину вище згаданих симптомів.

- A** *Зниження рівня кальцію в крові.
- B** Підвищення рівня кальцію в крові.
- C** Метаболічний ацидоз.
- D** Підвищення рівня фосфору в крові.
- E** Зниження рівня фосфору в крові.

107

12-річна дитина — госпіталізована з підвищеною температурою. Попередньо перехворіла на загострення хронічного тонзиліту. Об'єктивно: летючий біль у великих суглобах, біль у серці, задишка. Лабораторно: лейкоцитоз, CRB ++. Ваш попередній діагноз?

- A** *Гостра ревматична лихоманка.
- B** Скарлатина.
- C** Інфекційний мононуклеоз.
- D** ГРВІ.
- E** Фарингіт.

108

Хлопчику в пологовому будинку встановлено діагноз природженої вади серця (ДМШП). У 2 міс. віці з'явилася задишка, тахікардія, збільшення печінки. Які препарати необхідно застосувати для покращення стану?

- A** *Серцеві глікозиди.
- B** Нестероїдні протизапальні.
- C** Препарати калію.
- D** Бета-блокатори.
- E** Глюкокортикоїди.

109

За перший рік життя довжина тіла дитини всередньому збільшується на:

- A** *25 см.
- B** 35 см.
- C** 10см.
- D** 15см.
- E** 18см.

110

Дитина народилася з масою 3000 гр. Якою повинна бути маса у віці 3-х місяців

- A** *5200 г
- B** 5000 г
- C** 5400 г
- D** 5600 г
- E** 5800 г

111

У якому віці вводять I прикорм у разі природного вигодовування?

- A** *У 6 місяців
- B** У 5 місяців
- C** У 9 місяців
- D** У 8 місяців
- E** У 7 місяців

112

Якою повинна бути температура води для гігієнічної ванни?

- A** *37°C
- B** 39°C
- C** 28°C
- D** 40°C
- E** 60°C

113

Який лікарський препарат застосовують для вторинної профілактики ревматизму?

- A** *Біцилін – 5
- B** Ацетилсаліцилову кислоту
- C** Ампіцілін
- D** Аскорбінову кислоту
- E** Діазолін

114

Яка повинна бути температура рідини для промивання шлунку дитині?

- A** *20-24°C
- B** 16-18°C
- C** 48-50°C
- D** 30-32°C
- E** 10-12°C

115

Кількість води для постановки очисної клізми дитині 3-х місяців

- A** *50 мл
- B** 10 мл
- C** 30 мл
- D** 80 мл
- E** 100 мл

Нижче за який показник знижується рівень гемоглобіну при анемії?

- A** *120 г/л
- B** 80 г/л
- C** 90 г/л
- D** 100 г/л
- E** 140 г/л

117

Як збирають сечу для проведення проби за Зимницьким

- A** *За добу кожні 3 години в окремий посуд
- B** Зранку за 3 години
- C** За добу в один посуд
- D** За 12 годин в один посуд
- E** За 12 годин в кожні 3 години в окремий посуд

118

Для якого захворювання характерні гематурія, протеїнурія, гіпостенурія.

- A** *Гломерулонефриту
- B** Інфекція сечовивідних шляхів
- C** Гострого циститу
- D** Пієлонефриту
- E** Цукрового діабету

119

Який препарат застосовують при гострому пієлонефриті?

- A** *Фурадонін
- B** Фуросемід
- C** Діазолін
- D** Фестал
- E** Преднізолон

120

Який препарат призначають при гіпоглікемічній комі?

- A** *Розчин глюкози
- B** Інсулін
- C** Кокарбоксилазу
- D** Розчин натрію гідрокарбонату
- E** Розчин аскорбінової кислоти

121

Який препарат вводять дітям при судомас

- A** *Сибазон
- B** Анальгін
- C** Вітамін Д
- D** 20% розчин глюкози
- E** Димедрол

122

Співвідношення частоти вдихів і натискань на грудину

- A** *На 1 вдих 5 натискувань
- B** На 1 вдих 3 натискання
- C** На 1 вдих 4 натискання
- D** Одне натискання на 1 вдих
- E** Одне натискання на 3-4 вдихи

123

У якому віці здійснюють щеплення проти вірусного гепатиту В?

- A** * На 1 добу, в 1 та 6 місяців
- B** На 3 добу, у 7, 14 років
- C** У 3, 4, 5, 18 місяців
- D** У 3, 4, 5, 18 місяців; 6, 14 років
- E** У 12 місяців, 6 років

124

Підчас щеплення АКДП – дитина зблідла, втратила свідомість, АТ 70/40 мм рт ст., липкий піт. Який стан виник у дитини?

- A** * Анафілактичний шок
- B** Непритомність
- C** Гостра серцево-судинна недостатність
- D** Колапс
- E** Епілептичний напад

125

Через який час після народження дитини акушерка повинна виміряти температуру тіла?

- A** * 30 хвилин
- B** 40 хвилин
- C** 60 хвилин
- D** 2 години
- E** Не вимірюють

126

На яку відстань від пупкового кільця накладають клеми новонародженій дитині?

- A** * 0,5 см
- B** 1 см
- C** 2 см
- D** 5 см
- E** 10 см

127

Як довго триває контакт “шкіра-до-шкіри” матері та новонародженої дитини в пологовій залі?

- A** * 2 години
- B** 30 хвилин
- C** 1,5 годин
- D** До початку годування
- E** Цілодобово

128

Дитині 14 днів, поступила на лікування з ознаками гнійного омфаліту та підозрою на сепсис. Яке лабораторне дослідження підтверджує діагноз?

- A** * Бактеріологічний посів крові
- B** Загальний аналіз крові
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Копрологічне дослідження
- E** Кал на дизбактеріоз

129

При обстеженні дитини 3-х місяців виявлено облісіння потилиці, розлади сну, підвищену пітливість під час годування. На яке захворювання вказують ці симптоми?

- A** * Рахіт

- B** Гіпервітаміноз "Д"
- C** Спазмофілія
- D** Гіпотрофія
- E** Гіповітаміноз вітаміну "В"

130

Після народження дитини стан новонародженого оцінюють за шкалою Апгар. Скільки балів складає задовільний стан?

- A** * 8-10
- B** 6-7
- C** 4-5
- D** 2-4
- E** 1-3

131

Під час пологів акушерка помітила жовтяничне забарвлення навколоплідних вод; при огляді новонародженого спостерігається жовтяничне забарвлення пупкового канатика, шкіри і слизових. У матері Rh (-) у дитини Rh (+). Про яке захворювання можна подумати.

- A** * Жовтянична форма гемолітичної хвороби
- B** Анемічна форма гемолітичної хвороби
- C** Набрякова форма гемолітичної хвороби
- D** Атрезія жовчних шляхів
- E** Вроджений гепатит

132

Дитині проведено пробу Манту. Через 72 години на внутрішній поверхні передпліччя з'явилась папула діаметром 5 мм. Як оцінити результат проби?

- A** * Позитивна реакція
- B** Сумнівна реакція
- C** Слабо позитивна реакція
- D** Негативна реакція
- E** Гіперергічна реакція

133

До Вас звернулася мати з дитиною 12-ти років з ознаками харчового отруєння. Який елемент невідкладної допомоги слід застосувати в даному випадку?

- A** * Промивання шлунка
- B** Призначення антибіотиків
- C** Постановка гіпертонічної клізми
- D** Оксигенотерапія
- E** Зондування шлунка

134

У дитині 11-ти місяців рахіт. Під час плачу наступила короткочасна зупинка дихання з послідуємим гучним вдихом - "півнячим криком". Який стан можна запідозрити у дитини?

- A** * Спазмофілія, ларингоспазм
- B** Гіпервітаміноз вітаміну "Д"
- C** Спазмофілія, карпопедальний спазм
- D** Несправжній круп
- E** Спазмофілія, еклампсія

135

При огляді зіву дитині 5-ти років видно на мигдаликах сірий наліт, який важко знімається шпателем. Яке захворювання треба запідозрити?

- A** * Дифтерія мигдаликів
- B** Афтозний стоматит

- C** Хронічний тонзиліт
- D** Лакунарна ангіна
- E** Кандидозний стоматит

136

Дівчинці 7 діб. Під час огляду акушерка виявила набрякання і збільшення грудних залоз, шкіра над ними не змінена. Зі статевої щілини кров'янисто-слизові виділення. Який стан спостерігається у дитини?

- A** *Статевий криз
- B** Токсична еритема
- C** Сечокислий інфаркт
- D** Транзиторна гіпотермія
- E** Транзиторна жовтяниця

137

Дитина, яка народилася з масою тіла 3500 г, довжиною тіла 52 см, гестаційний вік – 40 тижнів. Вона голосно кричить, активно смокче, добре утримує тепло, виражений м'язевий тонус та фізіологічні рефлексії це:

- A** *Доношена новонароджена дитина
- B** Недоношена новонароджена дитина
- C** Переношена новонароджена дитина
- D** Дитина народжена в асфіксії
- E** Природжена гіпотрофія

138

Дитині віком 5 міс. мати вперше ввела 120 г картопляного пюре. Через 40 хв. дитина стала млявою, в неї виникла блювота, рідкі випорожнення жовто-зеленого забарвлення з білими грудочками. Загальний стан не порушений, температура тіла 36,7°C. Яка хвороба у дитини?

- A** *Проста диспепсія
- B** Рахіт
- C** Гіпотрофія
- D** Спазмофілія
- E** Анемія

139

У дитини віком 1,5 р., яка хворіє другий день, спостерігається гавкаючий сухий кашель, осиплість голосу, вночі з'явилася задишка, періоральний ціаноз. Визначте діагноз:

- A** *Стенозуючий ларинготрахеїт
- B** Гострий бронхіт
- C** Гостра пневмонія
- D** Гострий назофарингіт
- E** Вогнищева пневмонія

140

У дитини 6 міс., під час аускультатії серця вислуховують грубий шум "машинного характеру", який вислуховується від моменту народження. Об'єктивно: шкіра бліда, відставання у фізичному розвитку. Така клінічна картина характерна для:

- A** *Природжена вада серця
- B** Анемія
- C** Гіпотрофія
- D** Ревматизм
- E** Пневмонія

141

Дитина народилася здоровою з масою тіла 3300 г, довжиною тіла 50 см. Не хворіє.

Визначте, в якому віці треба починати профілактику рахіту:

- A** *На 2-му місяці життя
- B** На 3-му місяці життя
- C** На 4-му місяці життя
- D** На 7-му місяці життя
- E** На 8-му місяці життя

142

Після ін'єкції цефтріаксону у дівчинки різко погіршився стан: відчуття жару, блідість шкіри, алергійний висип, пульс слабкий, АТ знижується, утруднене дихання, запаморочення. Який препарат потрібно ввести у першу чергу?

- A** *0,1% розчин адреналіну гідрохлориду
- B** 2% розчин еуфіліну
- C** 10% розчин кальцію глюконату
- D** 50% розчин анальгін
- E** 5% розчин ефедрину гідрохлориду

143

Під час огляду дитини акушерка виявила почервоніння шкіри навколо пупка, серозно-гнійні виділення з пупкової ранки. Дитина неспокійна. Погано смокче груди. Температура тіла 38,5°C. Яка тактика акушерки?

- A** *Госпіталізує дитину
- B** Проведе місцеве лікування
- C** Назначить загальне лікування
- D** Викличе лікаря швидкої допомоги
- E** Проведе УФ-опромінення

144

Новонародженій дитині в пологовому будинку проводять вакцинацію проти туберкульозу. Як вводять вакцину БЦЖ?

- A** *Внутрішньошкірно
- B** Підшкірно
- C** Внутрішньом'язово
- D** Внутрішньовенно
- E** Внутрішньоартеріально

145

Мати з дитиною віком 1 місяць прийшла на прийом на ФАП, задала питання: "Який середній приріст маси тіла на першому місяці життя"?

- A** *600 г
- B** 100 г
- C** 200 г
- D** 400 г
- E** 300 г

146

На прийом на ФАП прийшла мама з дитиною 2-х місяців та поскаржилася, що хлопчик не витримує перерви між годуваннями, неспокійний, рідко мочиться. Що повинна порекомендувати акушерка?

- A** *Провести контрольне зважування
- B** Збільшити час годування
- C** Догодовувати дитину сумішшю
- D** Поїти дитину між годуваннями водою
- E** Зменшити час між годуваннями

147

Дитині 3 роки. Стан важкий, температура тіла – 39,4°C, на слизовій оболонці мигдаликів плівки сірого кольору, які важко знімаються шпателем і кровоточать після зняття.

Вкажіть найдоцільніший метод лікування дифтерії зіву:

- A** *Антитоксична сироватка
- B** Туберкулін
- C** Антибіотики
- D** Інтерферон
- E** Глюкокортикостероїди

148

У дитини 6 років скарги на слабкість, млявість, погіршення апетиту. Температура тіла 39°C. Шкіра бліда. Часті болісні сечовипускання, але сечі мало, вона каламутна. Дитині поставлений діагноз: гострий пієлонефрит. Яку дієту призначають цій дитині?

- A** *Дієта № 5
- B** Дієта № 10
- C** Дієта № 9
- D** Дієта № 1
- E** Дієта № 4

149

Стан хлопчика 11 років, який стоїть на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету, різко погіршився. У дитини після введення інсуліну з'явилося тремтіння рук і ніг, шкіра бліда, покрилася холодним липким потом. Затьмарена свідомість. Що необхідно ввести для надання невідкладної допомоги?

- A** *40% розчин глюкози
- B** 24 ОД інсуліну
- C** 4% розчин натрію гідрокарбонату
- D** 0,9% розчин натрію хлориду
- E** 10% р-н кальцію хлориду

150

Під час першого патронажу новонародженого акушерка при огляді дитини виявила помірне почервоніння в ділянці пахових складок та сідниць. Чим акушерка порекомендує матері обробляти складки новонародженого?

- A** *Дитяча олія
- B** 3% розчин перекисю водню
- C** 70% розчин етилового спирту
- D** 1% розчин діамантового зеленого
- E** 5% розчин йоду

151

У дитини 4 років $t - 38,9^{\circ}\text{C}$ на тлі ГРВІ, шкіра щік гіперемійована, відчуття жару. Що насамперед ви використаєте для зниження температури тіла?

- A** *Фізичні методи охолодження.
- B** Літичну суміш.
- C** Відволікаючу терапію.
- D** Антибактеріальну терапію.
- E** Антигістамінні засоби.

152

У дитини 9-ти місяців виникла раптово зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом. Через одну хвилину з'явився гучний вдих- "півнячий крик". З чого слід розпочати невідкладну допомогу при даному стані?

- A** *Ввести 0,5% розчин седуксену.
- B** Ввести 10% розчин кофеїну.
- C** Ввести 50% розчин анальгін
- D** Ввести 5% розчин вітаміну С.

E Ввести 1% розчин нікотинової кислоти.

153

До акушерки ФАПу звернулася мати з дитиною 7 років. Захворювання розпочалося 3 дні тому з болю в горлі, $t - 37,8-38,3^{\circ}\text{C}$, головний біль, з'явилася дрібноцяткова висипка, рясна, яскраво-червона, переважно в складках шкіри, блідий носо-губний трикутник, язик обкладений білим нальотом. Який більш імовірний діагноз?

- A** *Скарлатина.
- B** Вітряна віспа.
- C** Кір.
- D** Краснуха.
- E** Менінгококцемія.

154

Акушерка ФАПу оглядає дитину 6 місяців, перебуває на грудному вигодовуванні. Дитина активна, посміхається, добре впізнає маму. Який продукт доцільно порадити призначити дитині для першого прикорму?

- A** *Овочеve пюре.
- B** Кефір.
- C** Манну кашу.
- D** Сир.
- E** Яблучний сік.

155

До акушерки ФАПу звернулася мати з дитиною 3 років, яка захворіла 2 дні тому, $t - 37,8^{\circ}\text{C}$. На шкірі спини, сідниць плямисто-папульозна висипка, збільшені задньошийні та потиличні лімфатичні вузли. На яке захворювання вказують такі симптоми?

- A** *Краснуха.
- B** Кір.
- C** Скарлатина.
- D** Вітряна віспа..
- E** Атопічний дерматит.

156

До акушерки ФАПу звернулася бабуся з онукою 7 років, яку вкусила оса в ділянці обличчя. Через 30 хвилин дитина почала скаржитись на головний біль, осиплість голосу, припухлість на губах, щоках, повіках. Ваші першочергові дії при наданні невідкладної допомоги дитині?

- A** *Покласти холод на місце укусу і обколоти 0,1% розчином адреналіну, розведеним 0,9% розчином натрію хлориду
- B** Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину.
- C** Ввести 50%розчин анальгіну внутрішньом'язево.
- D** Ввести 10% розчин глюкози внутрішньовенно.
- E** Ввести 10% розчин кальцію хлориду внутрішньовенно.

157

Мама дитини 9 місяців запитала в акушерки ФАПу в якому віці відбувається закриття великого тім'ячка у здорової дитини?

- A** *8-18 місяців.
- B** 6-7 місяців.
- C** 7-8 місяців.
- D** 18-20 місяців.
- E** 21-24 місяців.

158

Акушерка ФАПу оглядає дитину 9 місяців. Дівчинка здорова. Тони серця ритмічні. Яка

частота серцевих скорочень відповідає даному віку дитини (за 1 хвилину)?

- A** *120-130.
- B** 140-160.
- C** 110-120.
- D** 100-110.
- E** 80-90.

159

Після огляду дитини 3 місяців акушерка робить запис в історії розвитку дитини про еволюцію знака БЦЖ. Найімовірніше в нормі на місці введення вакцини спостерігається:

- A** *Рубець округлої форми.
- B** Гіперемія.
- C** Папула.
- D** Пустула.
- E** Кірочка.

160

Мама з дитиною 3 місяців прийшла на прийом до акушерки ФАПУ. Хлопчик здоров, $t=36.5^{\circ}\text{C}$, шкіра рожева, зі сторони внутрішніх органів патології не виявлено. Після отримання письмової згоди дитині необхідно зробити вакцинацію. Яку вакцину необхідно ввести згідно календарю щеплень?

- A** * Пентаксим
- B** БЦЖ.
- C** Туберкулін.
- D** КПК.
- E** Проти гепатиту Б.

161

Дитина, віком 4-х місяців, лікувалась в стаціонарі з приводу гіпотрофії. Після закінчення курсу лікування виписана до дому і буде знаходитись під спостереженням акушерки ФАПУ. Що необхідно акушерці призначити дитині для нормалізації мікрофлори кишечника?

- A** * Бактисуптил.
- B** Плазму.
- C** Преднізолон.
- D** Нерабол.
- E** Альбумін.

162

У дівчинки 10 років скарги на ниючий біль у правому підреб'ї, поганий апетит, нудоту, відчуття гіркоти в роті. Під час пальпації живота – незначне напруження м'язів і біль у правому підреб'ї. Позитивний симптом Ортнера. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** * Хронічний холецистит.
- B** Хронічний гастрит.
- C** Виразкова хвороба 12-ти палої кишки.
- D** Дискінезія жовчних шляхів.
- E** Ентероколіт.

163

Дитина 13-ти років скаржиться на швидку стомлюваність, дратівливість, зміну почерку. Місяць тому перехворіла на ангіну. Об'єктивно: шкіра бліда, спостерігаються мимовільні скорочення м'язів обличчя, мигдалики гіпертрофовані. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** * Мала хорія.
- B** Неревматичний кардит.
- C** Ревматоїдний поліартрит.
- D** Системний червоний вовчак.
- E** Інфекційний ендокардит.

164

Мале тім'ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками:

- A** * Потиличною та тім'яними
- B** Лобними та тім'яними
- C** Лобними
- D** Скроневими та тім'яними
- E** Лобними та скроневими

165

Акушерка доглядає дитину, хвору на краснуху. Вкажіть максимальний інкубаційний період.

- A** * 21 день
- B** 14 днів
- C** 7 днів
- D** 5 днів
- E** 2 дні

166

Дитині 10 днів. Мати скаржиться на періодичне зригування після годування груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?

- A** * Слабкість кардіального сфінктера шлунка
- B** Підвищена секреторна активність шлунка
- C** Знижена секреторна активність шлунка
- D** Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка
- E** Підвищена перистальтика шлунка

167

Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в пологовому будинку?

- A** * В перші 30 хв після народження
- B** Через 2,5 год.
- C** Через 40 хв.
- D** Через 3 год.
- E** Через 3.5 год.

168

У дитини 4-х років з'явилася лихоманка до 39С, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка палпується у вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?

- A** * Дизентерія
- B** Холера
- C** Токсична диспепсія
- D** Ешерихіоз
- E** Сальмонельоз

169

Дитині 4-х місяців на грудному вигодовуванні, нервово-психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. З якого віку слід ввести дитині перший прикорм?

- A** * З 6-ти місяців
- B** З 4 місяців
- C** З 3-ох місяців
- D** З 7 місяців
- E** З 8 місяців

170

Дитині 6 місяців. Здорова. Знаходиться на природному вигодовуванні. В якому віці і який прикорм треба ввести дитині?

- A** * 3 6 місяців, овочеve пюре
- B** 3 5 місяців, сік фруктовий
- C** 3 4 місяців, овочеve пюре
- D** 3 6-ти місяців, кефір
- E** 3 6-ти місяців, 20% манна каша

171

Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни характеру дихання можна виявити під час обстеження?

- A** * Експіраторну задишку
- B** Інспіраторну задишку
- C** Апноє
- D** Брадіпноє
- E** Тахіпноє

172

При огляді новонародженої дитини на 3-тю добу життя виявлено зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини задовільний. З чим пов'язана дана проблема?

- A** * Фізіологічна втрата маси тіла
- B** Транзиторний дисбактеріоз
- C** Токсична еритема
- D** Сечокислий інфаркт нирок
- E** Статева криза

173

Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Яку з нижче перерахованих ванн треба обрати?

- A** * З додаванням морської солі
- B** З додаванням відвару ромашки
- C** З додаванням відвару дубової кори
- D** З додаванням крохмалю
- E** З додаванням відвару череди

174

Дитині 9 місяців. Знаходиться на грудному вигодовуванні, прикорм введений своєчасно. Мати запитує: "До якого віку бажано годувати груддю?"

- A** * До 2-х років
- B** До 1 року
- C** До 9 місяців
- D** До 6 місяців
- E** До 7 місяців

175

В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 10 років з діагнозом "Гостра кишкова інфекція". Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього діагнозу?

- A** * Бактеріологічне дослідження калу
- B** Копрограма
- C** Колоноскопія
- D** Зіскріб на ентеробіоз
- E** Аналіз калу на яйця гельмінтів

176

Призначте обстеження дитині 5-ти років, у якої протягом двох тижнів спостерігається кашель, який посилюється вночі і не піддається симптоматичному лікуванню. Поступово кашель набув нападаподібного характеру з репризами. Лікарем діагностовано кашлюк.

- A** * Бактеріологічне обстеження слизу
- B** Аналіз крові на біохімічне дослідження
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Взяти змиви із носоглотки на вірусологічне дослідження
- E** Рентгенологічне обстеження

177

Ребенку необхідно провести першу ревакцинацію АКДС. Назовите строки проведения ревакцинации АКДС.

- A** * 18 місяців
- B** 12 місяців
- C** 10 місяців
- D** 8 місяців
- E** 6 місяців

178

Дитині 3 місяці. На грудному вигодовуванні. Під час активного патронажу медична сестра виявила у дитини підвищену пітливість, особливо в ділянці потилиці, симптом “облисіння потилиці”, підвищену подразливість, неспокій, податливість країв великого тім’ячка. Про яке захворювання можна подумати?

- A** Рахіт
- B** Пневмонія
- C** Гідроцефалія
- D** Гіпотрофія
- E** Паратрофія

179

Акушерка оглянула доношену дитину 10-ти днів. Її фізичний розвиток вона оцінила як відповідний до віку. Яка маса тіла дитини стала підставою для висновку

- A** * дорівнює масі при народженні
- B** втрата 200 г маси
- C** збільшення маси на 150 г
- D** збільшення маси на 200 г
- E** втрата 150 г маси

180

Новонароджена дитина в’яла, голос грубий, захриплий. Спостерігаються набряк обличчя, великий язик, що не вміщається в роті. Шкірні покриви сухі, гіпотонія м’язів. ЧСС- 100/хв. Який препарат призначають при даній патології по-життєво?

- A** * L- тироксин
- B** Мерказоліл
- C** Дигоксин
- D** Діакарб
- E** Пентоксил