

1

В гінекологічному відділенні у вагітної 24 тижня скарги на підвищення температури до 39°C, біль у грудній клітці, вологий кашель з іржавим харкотинням. Об'єктивно: слабкість, гіперемія щік, ЧД – 28/хв.; перкуторно - в нижніх відділах лівої легені притуплення звуку; аускультативно - дрібнопухирчасті вологі хрипи. Після початку лікування протягом 3-х годин температура тіла знизилася з 39°C до 36°C. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яке ускладнення виникло?

- A** \*Гостра судинна недостатність
- B** Хронічна судинна недостатність
- C** Гостра серцева недостатність
- D** Хронічна серцева недостатність
- E** Гостра дихальна недостатність

2

До акушерки в гінекологічному відділенні звернулася вагітна терміном 12 тижнів зі скаргою на відчуття серцебиття. Після дослідження пульсу акушерка заспокоїла вагітну, пояснюючи, що все в нормі. Які властивості має пульс в нормі?

- A** \*Частота 70 за 1 хв., ритмічний, доброго наповнення і задовільного напруження
- B** Частота 70 пульсових коливань за 1 хв., ритмічний, напружений
- C** Частота 90 за 1 хв., аритмічний, м'який
- D** Частота 50 за 1 хв., ритмічний, високий
- E** Частота 80 за 1 хв., аритмічний, слабкого наповнення

3

До акушерки ФАПу, у відсутності фельдшера звернулася хвора зі скаргами на слабкість, підвищення  $t$  тіла, біль у колінному суглобі. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому хворіла ангіною. Встановлено діагноз – ревматизм. Які заходи належать до первинної профілактики ревматизму?

- A** \*Санація хронічних вогнищ інфекції.
- B** Додержання дієти № 10.
- C** Прийом аспірину протягом 1 місяця
- D** Обмеження фізичної активності
- E** Введення біциліну-5.

4

Пацієнтка 39 років знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні з діагнозом ендометрит. У неї з'явся біль в епігастрії, що виникає через 3-4 години після прийому їжі, турбують голодні нічні болі, нудота. Біль знімаються прийомом їжі. Для встановлення діагнозу призначено проведення ФГДС. Яка підготовка пацієнтки до дослідження:

- A** \*Попередити прийти натще, принести рушник
- B** Виконати очисну клізму ввечері та вранці
- C** Виконати сифонну клізму
- D** Дати проносне
- E** Ввести газовідвідну трубку

5

Ви акушерка ФАПу. На вашій ділянці мешкає вагітна жінка, яка скаржиться на зміну смаку (потреба їсти крейду), появу болючих тріщин у куточках роту, ламкість нігтів та випадіння волосся. Встановлено діагноз: залізодефіцитна анемія. Які продукти треба порадити збільшити у раціоні вагітної?

- A** \*М'ясо
- B** Гарбуз
- C** Горіхи
- D** Сир
- E** Мед

6

Пацієнтка 23 років лікується у гінекологічному відділенні. Після введення антибіотику у хворій раптово виникло запаморочення, біль в грудній клітці, задишка, зниження АТ, ниткоподібний пульс. Ускладнення, яке виникло у пацієнтки.

- A** \*Анафілактичний шок
- B** Інфаркт міокарда
- C** набряк легень
- D** Серцева астма
- E** Колапс

7

Вагітна жінка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострого пієлонефриту. Після в/м'язевого введення антибіотику погіршився стан: з'явилася слабкість, тремтіння тіла, свербіж шкіри, нудота. Через декілька хвилин вона знепритомніла. Шкіра бліда, пульс 102/хв., АТ 80/40 мм рт.ст. Яка невідкладна долікарська допомога?

- A** \*Холод на місце ін'єкції, обколоти місце ін'єкції адреналіном
- B** Горизонтальне положення, дати нашатирний спирт
- C** Горизонтальне положення, дати зволожений кисень
- D** Напівсидяче положення, гірчичники на грудну клітку
- E** Горизонтальне положення, грілку до ніг

8

Пацієнтка 30 років скаржиться на інтенсивний нападopodobний біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праве плече та лопатку, нудоту, повторне блювання. З анамнезу відомо, що протягом 2-х років хворіє на жовчнокам'яну хворобу. Яке ускладнення виникло?

- A** \*Печінкова коліка
- B** Ниркова коліка
- C** Печінкова недостатність
- D** Гостра ниркова недостатність
- E** Хронічна ниркова недостатність

9

До акушерки ФАПу звернувся чоловік зі скаргами на напади стискаючого болю за грудиною під час ходьби та психоемоційних стресів, з іррадіацією у ліву руку, під ліву лопатку. Біль минає в стані спокою через 5–7 хв. Яка найбільш доцільна невідкладна долікарська допомога у даному випадку?

- A** \*Призначити нітрогліцерин 0,0005 мг під язик
- B** Призначити аспірин 80 мг розжувати
- C** Призначити но-шпу 2% - 2 мл в/м
- D** Призначити папаверин 2% - 2 мл в/м
- E** Призначити анаприлін 20-40 мг перорально

10

До акушерки звернулася пацієнтка 30р., яка скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, спотворення смаку (їсть крейду), пекучий біль у язиці після їжі, появу "заїдів" у куточках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Яке дослідження треба провести для встановлення діагнозу?

- A** \*Загальний аналіз крові
- B** Стерильну пункцію
- C** Аналіз крові на глюкозу
- D** Аналіз крові на реакцію Васермана
- E** Аналіз крові на ВІЛ-інфекцію

11

Пацієнтка скаржиться на сухість у роті, спрагу, нудоту. В анамнезі: цукровий діабет. Об'єктивно: запах ацетону з рота, шкіра суха, рум'янець на обличчі. Дихання глибоке,

шумне, тони серця приглушені. PS 120/хв, слабкого наповнення, АТ 80/45 мм рт.ст. Через деякий час жінка втратила свідомість. Який першочерговий препарат для надання невідкладної допомоги треба ввести?

- A** \*Інсулін
- B** Р-н глюкози
- C** Р-н бікарбонату натрію
- D** Мезатон
- E** Дибазол

12

З метою проведення протирецидивного лікування ревматичної хвороби пацієнтам слід вводити:

- A** Біцилін
- B** Преднізолон
- C** Інсулін
- D** Папаверин
- E** Аналгін

13

При обстеженні у пацієнтки виявлені: запаморочення, миготіння “мушок” перед очима, задишка при незначному фізичному навантаженні, блідість шкіри, тахікардія, АТ-110/70 мм рт.ст. Про виникнення якого патологічного стану повинна подумати акушерка?

- A** Анемія
- B** набряк легень
- C** Напад бронхіальної астми
- D** Тиреотоксична криза
- E** -

14

Які рекомендації щодо дієтичного харчування надасть акушерка вагітній з великим ризиком розвитку анемії?

- A** Вживання яловичини, печінки
- B** Обмеження жирів та вуглеводів
- C** Збільшення калорійності їжі
- D** Обмеження в раціоні овочів та фруктів
- E** Обмеження вживання рідини

15

При обстеженні пацієнтки акушерка виявила симптоми: схуднення, пітливість, безсоння, метушливість, емоційну лабільність. Звернула увагу на витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тахікардія. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?

- A** Тиреотоксикоз
- B** Гіпотиреоз
- C** Ішемічна хвороба серця
- D** Ревматизм
- E** Гіпертонічна хвороба

16

У пацієнтки, що лікується у відділенні патології вагітності, виник гіпертензивний криз. Який медикаментозний засіб застосує акушерка за призначенням лікаря?

- A** Дибазол
- B** Вікасол
- C** Аспірин
- D** Аналгін
- E** Дицинон

17

Жінка 61 р. поскаржилася на раптове утруднення дихання, біль, відчуття стискання у за грудинній ділянці з іррадіацією під ліву лопатку. Виникнення якого невідкладного стану можна запідозрити?

- A** \* Напад стенокардії
- B** Напад бронхіальної астми
- C** Геморагічний синдром
- D** Колапс
- E** Гіпертермічний синдром

18

Пацієнтка скаржиться на різкий головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння "мушок" перед очима, нудоту. Хвора збуджена, пульс напружений, АТ – 200/110 мм рт.ст. Який патологічний стан розвинувся?

- A** \* Гіпертензивна криза
- B** Напад бронхіальної астми
- C** Непритомність
- D** Внутрішня кровотеча
- E** Гіперглікемія

19

Під час диспансерного огляду вагітної, що страждає на бронхіальну астму, у пацієнтки виник напад ядухи. Який медикаментозний засіб протипоказаний вагітним при наданні допомоги:

- A** \* Адреналін
- B** Астмопент
- C** Ефедрин
- D** Еуфілін
- E** Алупент

20

У хворої 68 р., що страждає на ІХС раптово виник напад ядухи. Під час огляду: хвора сидить, дихання клекочуче, утруднене, кашель з пінистим рожевим харкотинням, ЧД– 34/хв., Рс – 100/хв., АТ -110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологічного стану найбільш вірогідне у даному випадку?

- A** \* набряк легень
- B** Гіпертензивна криза
- C** Легенева кровотеча
- D** Напад бронхіальної астми
- E** Гіперглікемічна кома

21

Акушерка здійснює диспансерне спостереження за вагітною, що має вроджену ваду серця у стадії компенсації. Де, в першу чергу, можуть з'явитися набряки на початковій стадії серцевої недостатності?

- A** \* На стопах і гомілкях
- B** На обличчі
- C** У черевній порожнині
- D** В ділянці попереку
- E** У порожнині плеври

22

Під час звернення до акушерки вагітна жінка 30 р. , що страждає на цукровий діабет, раптово поскаржилася на різку слабкість, пітливість, запаморочення, головний біль, тремтіння кінцівок. Які першочергові дії акушерки щодо надання невідкладної допомоги?

- A** \* Напоїти солодким чаєм

- B** Госпіталізувати до відділення патології вагітності
- C** Виписати направлення для дослідження крові на глюкозу
- D** Надати рекомендації з дієтичного харчування
- E** -

23

У породіллі на другий день після пологів погіршився стан. Лікарем встановлені симптоми гострої пневмонії. Призначення якого антибіотика протипоказане під час вагітності і після пологів?

- A** \* Стрептоміцин
- B** Кефзол
- C** Цепорин
- D** Клафоран
- E** Ампіцилін

24

Жінка звернулася зі скаргами на посилення болю в епігастрії, слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, періодично відмічає відходження калу чорного кольору. Назвіть найбільш ймовірне ускладнення захворювання:

- A** \* Шлункова кровотеча
- B** Гострий гастрит
- C** Стеноз воротаря
- D** Перфорація виразки
- E** Печінкова колька

25

Пацієнт 62 років хворіє на хронічний бронхіт. Назвіть метод обстеження, що має особливе значення для визначення обструктивних порушень легеневої вентиляції:

- A** \* Спірографічне дослідження
- B** Рентгенологічне дослідження
- C** Бронхоскопія
- D** Аускультация легень
- E** Визначення бронхофонії

26

У хворого, що хворіє на туберкульоз, почалась легенева кровотеча з ознаками гострої судинної недостатності. Назвіть симптом найбільш характерний для колапсу:

- A** \* Різке зниження АТ
- B** Збереження реакції зіниць на світло
- C** Глибоке шумне дихання
- D** Зниження чутливості
- E** Підвищення АТ

27

Пацієнт 62 років скаржиться на слабкість, спрагу, запаморочення. Об'єктивно: шкіра суха, тонус м'язів знижений, язик сухий, запах ацетону з рота. Відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет. Яку допомогу слід надати пацієнту на догоспітальному етапі:

- A** \* Ввести інсулін короткої дії 20 ОД п/ш
- B** Ввести 5% розчин глюкози
- C** Ввести 0,9% розчин хлориду натрію 500 мл
- D** Ввести 0,45% розчин хлориду натрію 300 мл
- E** Ввести колоїдні плазмозамінники

28

Пацієнтка 51 року, яка знаходиться на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету, відчула раптове сильне відчуття голоду, неспокій, тремтіння тіла. Втратила

свідомість. Об'єктивно: АТ 75/35 мм рт.ст., тони серця приглушені, тахікардія. Шкіра бліда, волога на дотик. Глюкоза крові 2,2 ммоль/л. Виберіть препарат для надання невідкладної допомоги:

- A** \* 40% розчин глюкози
- B** Інсулін короткої дії
- C** 0,1% розчин адреналіну
- D** 60 мг преднізолону
- E** 2,4% розчин еуфіліну

29

Хвора скаржиться на біль у правому під ребер'ї, що віддає у лопатку, гіркоту та сухість у роті. Ці ознаки з'являються протягом двох років після вживання жирної, смаженої, гострої їжі. Стан задовільний, шкіра звичайного забарвлення, живіт м'який, помірно болючий в ділянці проекції жовчного міхура. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \* Хронічний холецистит в стадії загострення
- B** Хронічний панкреатит
- C** Хронічний коліт
- D** Хронічний гепатит в стадії загострення
- E** Цироз печінки

30

Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці зліва, часте болісне сечовипускання, підвищення температури до 39°C. Захворіла раптово, після переохолодження. Живіт м'який, болючий в лівій половині. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Визначить імовірний діагноз.

- A** \* Гострий пієлонефрит
- B** Гострий панкреатит
- C** Сечокам'яна хвороба
- D** Гострий гломерулонефрит
- E** Гострий коліт

31

Чоловік протягом останніх 2-3 років скаржиться на слабкість, сонливість, мерзлякуватість, апатію, погіршення пам'яті, збільшення ваги, постійні закрепи. Хворий адинамічний, шкіра бліда, холодна, суха, волосся рідке. Щитоподібна залоза не збільшена. Рівень ТТГ, Т3, Т4 в крові знижений. Які лікарські засоби буде призначено хворому для проведення замісної терапії?

- A** \* L-тироксин, трийодтиронін
- B** Строфантин, кордіамін
- C** Мерказоліл, панангін
- D** Поліглюкін, ізотонічний розчин натрію хлориду
- E** Гідрокортизон, преднізолон

32

У хворого 53 роки після психічного перенапруження, виник напад пекучого болю у ділянці серця, який віддає у нижню щелепу зліва, ліву лопатку, руку. Після прийому нітрогліцерину з'явилися побічні явища. Який побічний ефект найчастіше викликає нітрогліцерин?

- A** \* Головний біль
- B** Алергічну реакцію
- C** Тахікардію
- D** Брадикардію
- E** Порушення ритму серця

33

У хворого, який страждає на виразкову хворобу шлунка, з'явилися кинджальний біль у верхній половині живота, різка слабкість. Стан хворого середньої тяжкості, ноги

притягнуті до живота. Шкіра і видимі слизові бліді, вологі. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт напружений, не бере участі у диханні, різко болючий у верхній половині. Яке ускладнення виникло?

- A** \* Перфорація шлунка
- B** Шлункова кровотеча
- C** Пенетрація шлунка
- D** Кровотеча з вен стравоходу
- E** Кровотеча з гемороїдальних вен

34

Пацієнт без свідомості. Шкіра бліда, суха, дихання Куссмауля, в повітрі відчувається запах ацетону. Очні яблука м'які, рефлексів відсутні. Родичі хворого розповіли, що страждає на цукровий діабет. Що трапилось з хворим?

- A** \* Гіперглікемічна кома
- B** Запаморочення
- C** Гіпоглікемічна кома
- D** Уремична кома
- E** Печінкова кома

35

Хвора скаржиться на високу температуру, біль в грудній клітці праворуч, кашель із "іржавим" харкотинням. При вислуховуванні легень на бокових поверхнях праворуч визначається бронхіальне дихання, при перкусії – різко притуплений звук. На рентгенограмі легень – ознаки плевропневмонії. Її турбує наявність болю у грудній клітці. Чим зумовлений біль у грудній клітці?

- A** \* Ураженням плеври
- B** Обструкцією бронхіального дерева
- C** Ураженням альвеол
- D** Підвищенням тиску в малому колі кровообігу під час кашлю
- E** -

36

Пацієнтка скаржиться на запаморочення, задишку, серцебиття, ламкість нігтів і випадання волосся. Відзначає спотворення смаку : любить їсти крейду. Шкіра бліда, суха, злущується. В аналізі крові – ознаки анемії. Що треба визначити для уточнення виду анемії?

- A** \*Рівень заліза сироватки крові
- B** Час згортання крові
- C** Лейкоцитарну формулу
- D** Осмотичну резистентність еритроцитів
- E** Кількість ретикулоцитів

37

Пацієнт, хворий на ревматичну хворобу звернувся до ревматолога за поясненням – яким препаратом слід проводити сезонну профілактику загострення захворювання. Який лікарський засіб для цього застосовується?

- A** \* Біцилін -5
- B** Бензилпеніцилін
- C** Аспірин
- D** Цефазолін
- E** Ампіокс

38

Хворий звернувся зі скаргами на біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку, що виникає щодня під час підйому на 2-3 поверх. Хворіє протягом 2 років. Діяльність серця ритмічна. АТ – 140/90 мм рт. ст., ЧСС – 90/хв. Які препарати призначають для зменшення больового синдрому?

- A** \* Нітрати
- B** Інгібітори АПФ
- C** Пероральні антикоагулянти
- D** Статини
- E** Седативні препарати

39

Пацієнтку 25 років турбують біль у ділянці серця, серцебиття, підвищення температури тіла, біль у колінних суглобах. В анамнезі часті ангіни. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці серця, колінні суглоби болісні, припухлі, гарячі на дотик, функція їх порушена. За допомогою яких препаратів здійснюється етіотропна терапія даної пацієнтки?

- A** \* Антибіотиків
- B** Препаратів, що покращують метаболічні процеси в міокарді
- C** Глюкокортикостероїдних препаратів
- D** Нестероїдних протизапальних препаратів
- E** Серцевих глікозидів

40

У пацієнта 35 років з цукровим діабетом, виникла гіперглікемічна кома. При наданні невідкладної допомоги необхідно ввести?

- A** \* Інсулін
- B** Атропін
- C** Глюкозу
- D** Дибазол
- E** Метазон

41

У пацієнта 70 років виник нестерпний пекучий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, відчуття страху смерті. Біль триває 40 хвилин. не знявся після прийому нітрогліцерину . Вкажіть найбільш ймовірний діагноз?

- A** \* Інфарк міокарда
- B** набряк легень
- C** Стенокардія
- D** Серцева астма
- E** Міокардит

42

До вас звернувся пацієнт 54 роки, у якого після отримання неприємного повідомлення, з'явився стискаючий біль за грудиною, з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Вкажіть препарат з якого в першу чергу надають невідкладну допомогу ?

- A** \* Нітрогліцерин
- B** Но – шпа
- C** Фуросемід
- D** Аспірин
- E** Гепарин

43

Пацієнт хворіє декілька років сечокам'яною хворобою. Після тряскої їзди з'явився раптовий біль в правій поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи. Яке ускладнення виникло у хворого ?

- A** \* Ниркова колька
- B** Хронічний пієлонефрит
- C** Хронічний гломерулонефрит
- D** Хронічний цистит
- E** Хронічний панкреатит



44

Який дієтичний стіл призначають хворим з захворюваннями нирок?

- A** \* Стіл №7
- B** Стіл №5
- C** Стіл №10
- D** Стіл №2
- E** Стіл №9

45

Пацієнтка 19 років зі скаргами на біль в поперековій ділянці справа, часте сечовиділення, підвищення температури тіла до 39,5°C. Захворіла гостро після купання в річці. Яке захворювання можна запідозрити у хворої ?

- A** \* Гострий пієлонефрит
- B** Хронічний пієлонефрит
- C** Гострий цистит
- D** Сечокам'яна хвороба
- E** Ниркова колька

46

Хворий, 68 років скаржиться на кровохаркання впродовж тривалого часу. Для якого захворювання найбільш вірогідний такий стан?

- A** \* Рак легень
- B** Хронічний бронхіт
- C** Плеврит
- D** Крупозна пневмонія
- E** Пневмосклероз

47

При лабораторному обстеженні харкотиння у хворого виявили спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі зміни?

- A** \* Бронхіальна астма
- B** Гострий бронхіт
- C** Хронічний бронхіт
- D** Абсцес легень
- E** Плевропневмонія

48

Хворий, 47 років звернувся зі скаргами на збільшення живота в розмірах, загальну слабкість, нудоту, нестійкі випорожнення. Хворіє протягом 2-х років. При огляді шкіри: шкірні покриви та видимі слизові жовтяничні, на шкірі обличчя та спини „судинні зірочки,” живіт значно збільшений в розмірах, навколо пупка венозна сітка у вигляді „медузи” . Про яке захворювання можна подумати?

- A** \* Цироз печінки
- B** Хронічний гепатит
- C** Хронічний панкреатит
- D** Хронічний холецистит
- E** Жовчнокам'яна хвороба

49

У хворого з виразковою хворобою шлунка блювання кавовою гущею та дьогтеподібні випорожнення. Для якого ускладнення це характерно ?

- A** \* Кровотечі з виразки
- B** Пенетрації виразки
- C** Перфорації виразки
- D** Пілоростенозу
- E** Малігнізації виразки

50

У пацієнта гострий початок хвороби, біль у грудній клітці, виражена лихоманка, кашель з виділенням "ржавого" харкотиння, крепітація і бронхіальне дихання під час аускультатії. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \* Пневмонія
- B** Бронхіальна астма
- C** Хронічний бронхіт
- D** Абсцес легень
- E** Туберкульоз

51

У хворого ревматична хвороба. Назвіть етіологічний чинник.

- A** \*Бета–гемолітичний стрептокок групи А
- B** Стафілокок
- C** Паличка Коха
- D** Менінгокок
- E** Паличка Пфейфера

52

У пацієнта гострий інфаркт міокарда. Який вид транспортування необхідно застосувати ?

- A** \*Спеціалізованою бригадою швидкої медичної допомоги на ношах
- B** Направити в плановому порядку
- C** Попутнім транспортом
- D** Міським транспортом
- E** Транспортною бригадою швидкої допомоги на ношах

53

До ФАПУ звернулась жінка 50-ти років, яка скаржиться на різкий біль за грудиною, що іррадіює у ліву руку. Напад триває більше 30 хвилин, застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Що можна запідозрити у хворої?

- A** \* Інфаркт міокарда
- B** Гіпертонічний криз
- C** Напад стенокардії
- D** Серцева астма
- E** Вада серця

54

У пацієнта з виразковою хворобою шлунка виникла перфорація. Назвіть характер болю у випадку даного ускладнення.

- A** \* "Кинжальний"
- B** Ниючий
- C** Тиснучий
- D** Пекучий
- E** Оперізуючий

55

Хвора 37 років звернулась зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, блювоту. Позитивний симптом Ортнера та Мерфі. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A** \* Гострий холецистит
- B** Хронічний панкреатит
- C** Гострий гастрит
- D** Сечокам'яна хвороба
- E** Гострий панкреатит

56

Пацієнт з цукровим діабетом знаходиться на стаціонарному лікуванні. Яку дієту потрібно йому призначити?

- A** \* Дієта № 9
- B** Дієта № 5
- C** Дієта № 7
- D** Дієта № 1
- E** Дієта № 10

57

Хвора скаржиться на сонливість, загальмованість, мерзлякуватість, охриплий голос. Об'єктивно: брадикардія, набрякле обличчя з товстими губами, звужені очні щілини. Яке захворювання можна запідозрювати?

- A** \* Гіпотиреоз
- B** Хронічний гломерулонефрит
- C** Гіпертиреоз
- D** Гіпертонічна хвороба
- E** Ендемічний зоб

58

У хворої залізодефіцитна анемія. Які препарати застосовують для її лікування ?

- A** \* Ферумлек
- B** Гепарін
- C** Фурадонін
- D** Ампіокс
- E** Фуразолідон

59

Хворій з приводу пневмонії призначений антибіотик – цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у неї з'явилися відчуття жару, блідість, утруднене дихання, пульс ниткоподібний, АТ 85-60мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A** \* Анафілактичний шок
- B** набряк Квінке
- C** набряк легенів
- D** Колапс
- E** Серцева астма

60

У пацієнтки на тлі гострого інфаркту міокарда з'явилися кашель з виділенням пінистого харкотиння, клекочуче дихання. Яке ускладнення виникло?

- A** \* набряк легенів
- B** Напад бронхіальної астми
- C** набряк Квінке
- D** Миготлива аритмія
- E** Кардіогенний шок

61

У хворої на гострий інфаркт міокарду на фоні посилення больового синдрому з'явилась різка блідість шкіри, акроціаноз, АТ знизився до 80/40 мм рт. ст. Про розвиток якого ускладнення можна думати?

- A** \* Кардіогенний шок
- B** Серцева астма
- C** набряк легенів
- D** Непритомність
- E** Синдром Дресслера

62

Хвора лікується в гематологічному відділенні з приводу лімфогранулематозу. До якого інструментального дослідження слід підготувати хвору?

- A** \* Пункції лімфатичного вузла
- B** Люмбальної пункції
- C** Абдомінальної пункції
- D** Стернальної пункції
- E** Плевральної пункції

63

У пацієнтки діагностований напад ниркової кольки. Який комплекс невідкладної допомоги слід застосувати?

- A** \* Баралгін, папаверин
- B** Сульфат магнію, еуфілін
- C** Еуфілін, лазикс,
- D** Нітрогліцерин, но-шпа,
- E** Лазикс, платифілін

64

У пацієнтки вперше виникли набряки під очима, підвищився артеріальний тиск та при дослідженні сечі виявлена гематурія та протеїнурія. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \* Гострий гломерулонефрит
- B** Хронічний піелонефрит
- C** Гострий піелонефрит
- D** Хронічний гломерулонефрит
- E** -

65

У хворого хронічний панкреатит. Виберіть препарат замісної терапії.

- A** \* Фестал
- B** Контрикал
- C** Холензим
- D** Но-шпу
- E** Папаверин

66

У пацієнтки скарги на дратівливість, порушення сну, тремор кінцівок, серцебиття. Схудла на 6 кг. Об'єктивно: шкіра волога тепла; шия потовщена, збільшена щитоподібна залоза. Р – 96/хв., АТ 160/80 мм.рт.ст. Для якого захворювання характерна ця симптоматика?

- A** \* Дифузний токсичний зоб
- B** Цукровий діабет
- C** Гіпотиреоз
- D** Нецукровий діабет
- E** -

67

У хворої підозрюють гіпотиреоз. Які лабораторні методи дослідження слід провести?

- A** \* Визначення рівня гормонів Т3, Т4 в крові
- B** Визначення амілази сечі, амілази крові
- C** Визначення рівня глюкози в крові
- D** Аналіз сечі за методом Нечипоренка
- E** -

68

До акушерки ФАПу звернулася жінка, 38 років, зі скаргами на головний біль, "мушки" перед очима, відчуття жару, серцебиття, які виникли після сильного хвилювання. Об'єктивно: пацієнтка схвильована, тремтить. Шкіра обличчя гіперемована. АТ - 180/100 мм.рт.ст., Ps – 88/хв. Аускультативно: серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** \* Гіпертонічна хвороба
- B** ІХС. Стенокардія напруження
- C** Миготлива аритмія
- D** Ревматична лихоманка
- E** -

69

Жінка 44 років скаржиться на болі за грудиною з іррадіацією в ліву руку, які виникли після стресу. Об'єктивно: шкіра бліда. АТ - 110/60 мм.рт.ст., Ps – 78/хв. Аускультативно: тони серця ритмічні, приглушені. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A** \* Електрокардіографія
- B** УЗД органів черевної порожнини
- C** Флюорографія ОГК
- D** Бронхографія
- E** -

70

До акушерки на ФАП звернулася вагітна зі скаргами на спрагу, сухість в роті, слабкість. При огляді: жінка помірного харчування, шкіра бліда, суха на дотик. АТ 130/70 мм.рт.ст. Рівень глюкози крові - 9,7 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** \* Цукровий діабет
- B** Тиреотоксикоз
- C** Ожиріння
- D** Гіповітаміноз
- E** Гіпотиреоз

71

Під час взяття крові з вени жінка втратила свідомість. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, АТ 120/70 мм рт ст., пульс 68/хв., ритмічний, задовільних властивостей. Який стан найбільш вірогідно зумовлює таку картину?

- A** \* Непритомність.
- B** Колапс.
- C** Екламсія.
- D** Геморагічний шок.
- E** Кардіогенний шок.

72

До акушерки ФАПу звернулася пацієнтка, 38 років, зі скаргами на біль в поперековій ділянці, який іррадіює вздовж сечоводу в статеві органи. Який препарат найбільш доцільно застосувати в даному випадку?

- A** \* Ввести баралгін.
- B** Ввести лазікс.
- C** Ввести р-н еуфіліну.
- D** Ввести р-н магнія сульфату.
- E** -

73

У хворої 68 р., яка лікується з приводу пневмонії, погіршився стан: за дві години температура знизилася з 39,3°C до 35,7°C, відзначається різка слабкість, блідість шкіри, холодний піт, АТ 80/50 мм рт ст. Що стало найбільш вірогідною причиною погіршення стану пацієнтки:

- A** \*Критичне зниження температури тіла.
- B** Обмежене вживання рідини
- C** Порушення дієти.
- D** Виражена інтоксикація.
- E** Порушення рухового режиму.

74

При обстеженні у пацієнтки, яка зловживала алкоголем: свербіння шкіри, жовтяниця, судинні зірочки, асцит. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \* цироз печінки
- B** гепатит
- C** хронічний коліт
- D** панкреатит
- E** холецистит

75

Вкажіть хворобу, яка генетично успадковується за рецесивним типом.

- A** \* гемофілія
- B** тромбоцитопенія
- C** геморагічний васкуліт
- D** лімфолейкоз
- E** мієлолейкоз

76

У пацієнтки 39 років гострий інфаркт міокарда, перший день. Вкажіть, який режим фізичної активності призначите їй.

- A** \* суворий постільний
- B** постільний
- C** напівпостільний
- D** палатний
- E** загальний

77

Пацієнтку 23 років протягом місяця турбує слабкість, кашель, схуднення, пітливість, особливо вночі, субфебрильна температура . Об'єктивно: t 37,2°C, шкіра бліда, АТ 100/70 мм рт.ст.. Дихання ослаблене справа над верхівкою. Тони ритмічні, пульс 98 уд/ хв, ритмічний. Визначте захворювання, яке можна запідозрити.

- A** \* Туберкульоз легенів
- B** Рак легенів
- C** Пневмонію
- D** Бронхіт
- E** Плеврит

78

Пацієнтка Ш., 30 років, скаржиться на надмірну дратливість, серцебиття, схуднення при підвищеному апетиті. Об'єктивно: витрішкуватість, тремор рук, підвищення систолічного артеріального тиску, позитивний симптом Грефе. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \* Тиреотоксикоз
- B** Невроз
- C** Мікседему
- D** Гіпертонічну хворобу
- E** Цукровий діабет

79

Жінку 35 років вжалила бджола. Розвився анафілактичний шок. Який препарат необхідно зразу ввести?

- A** \* Гідрокортизон
- B** Кордіамін
- C** Корглікон
- D** Анальгін
- E** Папаверин

80

У пацієнтки 47 років, відмічається кашель з виділенням великої кількості (300 мл.) харкотиння "повним ротом" з неприємним запахом. Про яке захворювання можна подумати?

- A** \* Абсцес легені
- B** Рак легенів
- C** Пневмонію
- D** Бронхіальну астму
- E** Туберкульоз легенів

81

У пацієнтки 25 років при лабораторному дослідженні виявлено: загальний аналіз крові – еозинофілія, в харкотинні – спіралі Куршмана та кристали Шарко – Лейдена. Для якого захворювання характерні ці ознаки?

- A** \* Бронхіальної астми
- B** Хронічного бронхіту
- C** Раку легенів
- D** Пневмонії
- E** Абсцесу легені

82

Пацієнтка Н. 22-х лет обратилась на ФАП с жалобами на приступы удушья с затрудненным выдохом, которые возникают во время цветения амброзии. Ваш предположительный диагноз?

- A** \* Бронхиальная астма
- B** Хронический бронхит
- C** Экссудативный плеврит
- D** Туберкулёз лёгких
- E** Внегоспитальная пневмония

83

Беременной женщине 25-ти лет, поступившей на лечение в пульмонологическое отделение по поводу внегоспитальной пневмонии, назначено лечение, включающее антибиотик. Что нужно сделать, прежде чем вводить антибактериальный препарат внутримышечно?

- A** \* Провести пробу на чувствительность к антибиотику
- B** Подсчитать частоту дыхательных движений за 1 минуту
- C** Измерить АД
- D** Произвести спирографию
- E** Информировать больную о возможных побочных действиях

84

Пацієнтка К. 42-х лет, состоящая на диспансерном учёте по поводу гипертонической болезни в течение 10 лет, обратилась на ФАП с жалобами на новые симптомы, которые развились постепенно: одышку при небольшой физической нагрузке, сердцебиение, отёки на ногах. Какое осложнение развилось у больной?

- A** \* Хроническая недостаточность кровообращения
- B** Острая сердечная недостаточность
- C** Порок сердца
- D** Острая сосудистая недостаточность
- E** Гипертонический криз

85

При обследовании у пациентки Т. 30-ти лет выявлена недостаточность митрального клапана. Ранее патологии со стороны сердечно-сосудистой системы не было. Укажите ведущую причину приобретённых пороков сердца .

- A** \*Ревматическая болезнь
- B** ИБС. Стенокардия напряжения
- C** Гипертоническая болезнь
- D** Хроническая сердечная недостаточность
- E** Инфаркт миокарда

86

Акушерке поручено провести беседу с беременными женщинами по поводу профилактики острого пиелонефрита. На какие элементы профилактики следует обратить внимание женщин?

- A** \*Санация очагов инфекции
- B** Приём мочегонных трав
- C** Избегание пребывания на солнце
- D** Ограничение физической активности
- E** Профилактический приём витаминов

87

Больная К. 38-ми лет обратилась на ФАП с жалобами на очень сильные боли в левой половине поясницы с иррадиацией в паховую область, отмечает позывы к мочеиспусканию, но мочи выходит незначительное количество. Пациентка возбуждена, симптом Пастернацкого слева резко положительный. Температура тела – 36,5°C. Предположительный диагноз?

- A** \*Мочекаменная болезнь.
- B** Острый пиелонефрит
- C** Острый гломерулонефрит
- D** Хронический гломерулонефрит
- E** -

88

У пациента язвенная болезнь желудка. Назовите особенности диетотерапии.

- A** \*Частое, дробное питание, механически, термически и химически щадящая пища
- B** Разгрузочная диета
- C** Исключение молочных продуктов из пищевого рациона
- D** Увеличение количества белка
- E** Ограничение приема жидкости

89

Пациентку беспокоят сердцебиение и одышка при физической нагрузке, отеки нижних конечностей к концу дня. Для какого состояния характерны данные симптомы?

- A** \*Хроническая сердечная недостаточность
- B** Анафилактический шок
- C** Острая сердечная недостаточность
- D** Коллапс
- E** -

90

У пациентки подозрение на туберкулез легких. Какой препарат используют для пробы Манту?

- A** \*Туберкулин
- B** Вакцина БЦЖ
- C** Изониазид



- D** Этамбутол
- E** Рифампицин

91

Пациентке, страдающей ревматической болезнью, назначена вторичная профилактика заболевания. Какой из препаратов Вы используете?

- A** \*Бицилин-5
- B** Анальгин
- C** Пенициллин
- D** Преднизолон
- E** Ортофен

92

Пациентка 40 лет жалуется на боль сжимающего характера за грудиной с иррадиацией в левую руку. После приема нитроглицерина приступ прекратился. Для какого заболевания характерны эти признаки?

- A** \*Стенокардии
- B** Инфаркта миокарда
- C** Порока сердца
- D** Гипертонической болезни
- E** Ревматической болезни

93

Беременная 14 нед. Поступила в терапевтическое отделение с жалобами на боль в правой половине грудной клетки, кашель с выделением “ржавой мокроты”, общую слабость, температуру тела 39<sup>0</sup>С. Заболела 3 дня назад. Заболевание связывает с переохлождением. Перкуторно: притупление легочного звука, аускультативно: крепитация справа под лопаткой. Какой наиболее вероятный диагноз?

- A** \*Внегоспитальная пневмония
- B** Госпитальная пневмония
- C** Рак легких
- D** Бронхит
- E** Туберкулез легких

94

Пациентка 56 лет, жалуется на кашель с выделением гнойной мокроты неприятного запаха до 250 мл в сутки, преимущественно утром. Из анамнеза- курит 20 лет. Объективно: пальцы на руках в виде “барабанных палочек”, ногти в виде “часовых стекол”. Какое заболевание наиболее вероятно?

- A** \*Бронхоэктатическая болезнь
- B** Абсцесс легких
- C** Пневмония
- D** Хронический бронхит
- E** Рак легких

95

У пациентки на запах краски внезапно возникло удушье. В детстве болела бронхиальной астмой. При аускультации в легких масса сухих свистящих хрипов. Какая неотложная доврачебная помощь необходима в данной ситуации?

- A** \*Ингаляция сальбутамола
- B** Оксигенотерапия
- C** Горчичники на грудную клетку
- D** Горячие ножные ванны
- E** Банки на грудную клетку

96

Пациентка 58 лет, поступила в кардиологическое отделение с жалобами на сжимающую боль за грудиной, иррадиирующую в левое плечо, левую лопатку. Боль длится в течение часа, не снимается нитроглицерином. Объективно: кожа бледная, пульс слабый, частый, АД 90/60 мм рт.ст. Какое заболевание можно заподозрить у пациентки?

- A** \*Острый инфаркт миокарда
- B** Отек легких
- C** Сердечную астму
- D** Нарушение ритма сердца
- E** Миокардит

97

У пациентки с алкогольным циррозом печени возникла рвота цвета “кофейной гущи” и кал черного цвета. При осмотре: бледность кожи и слизистых оболочек, слабый, частый пульс. АД 100/ 60 мм рт.ст.Какие лекарственные препараты необходимо использовать в данной ситуации?

- A** \*Хлористый кальций
- B** Пентамин
- C** Гепарин
- D** Феррум-лек
- E** Атропин

98

У пациентки 25лет жалобы на повышение температуры тела до 39,0 С, проливной пот, боль в горле. Считает себя больной в течение нескольких месяцев. В полости рта некротические изменения: язвочки [некротическая ангина, стоматит]. В общем анализе крови найдены бластные клетки. Какой диагноз наиболее вероятен?

- A** \*Острый лейкоз
- B** Острая постгеморрагическая анемия
- C** Гемофилия
- D** В-12 фолиеводефицитная анемия
- E** Железодефицитная анемия

99

Беременная 23 лет лечится в отделении патологии беременных с диагнозом: “Острый пиелонефрит”. Какие настои трав рекомендуется употреблять пациентке по назначению врача после выписки из стационара?

- A** \*Полевой хвощ
- B** Мать-мачеха
- C** Зверобой
- D** Подорожник
- E** Чебрец

100

Пациентка 27лет, страдающая сахарным диабетом, предъявляет жалобы на головную боль, головокружение, жажду, тошноту. Постепенно появилась сонливость, апатия потеря сознания. При осмотре: кожа сухая, запах ацетона. Выберите препарат для оказания неотложной помощи.

- A** \*Инсулин простой
- B** Эуфиллин
- C** 40% раствор глюкозы
- D** 20% раствор глюкозы
- E** 4% раствор гидрокарбоната натрия

101

50-летняя пациентка предъявляет жалобы на зябкость, общую слабость, сонливость, отечность лица и конечностей. В анамнезе заболевание щитовидной железы.

Об'єктивно: кожа сухая, шелушащаяся. АД 110/70 мм рт.ст. Тоны сердца приглушены, брадикардия. Какой лекарственный препарат пациентка должна принимать постоянно в качестве профилактики осложнений?

- A** \*L- тироксин
- B** Мерказолил
- C** Инсулин
- D** Нитроглицерин
- E** Корвалол

102

Пацієнт з'явився на прийом до лікаря зі скаргами на підйом t тіла до 38°C, підвищену пітливість вночі, сухий кашель, біль у грудях, періодичне кровохаркання. Такі симптоми характерні для:

- A** \* Туберкульозу легенів
- B** Раку легень
- C** Плевриту
- D** Гангрени легень
- E** Пневмонії

103

Пацієнтка 40 р., знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом бронхіальна астма. Зненацька в неї виник приступ ядухи. Що в першу чергу необхідно застосувати?

- A** \* Аерозоль з беротеком
- B** Дихальну гімнастику
- C** Содові інгаляції
- D** Масаж грудної клітки
- E** Кисневу терапію

104

У пацієнта, який скаржиться на болі у грудній клітці з правого боку, що посилюються при диханні, встановлено діагноз сухий плеврит. Що визначається аускультативно при об'єктивному обстеженні?

- A** \* Шум тертя плеври
- B** Крепітація
- C** Сухі свистячі хрипи
- D** Вологі хрипи
- E** Посилення везикулярного дихання

105

Пацієнт 47 р., в стаціонарі при швидкому підйомі по сходах відчув раптовий стискаючий біль за грудиною, який віддає у ліву руку. Що в першу чергу необхідно зробити?

- A** Дати таблетку нітроглицерину
- B** Дати таблетку анальгін
- C** Дати краплі корвалолу
- D** Дати таблетку адельфана
- E** -

106

У пацієнта з інфарктом міокарда виник приступ ядухи, кашель з виділенням пінистого рожевого харкотиння. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A** \* набряк легенів
- B** Кардіогенний шок
- C** Плеврит
- D** Пневмонія
- E** Перикардит

107

Пацієнтка 64 р., скаржиться на головний біль, "миготіння мушок" перед очима, запаморочення, біль у ділянці серця, серцебиття. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, Рs – 95/хв., АТ – 175/100 мм рт. ст. Аускультативно: тони серця звучні, акцент ІІ тону над аортою. Який ваш діагноз?

- A** \* Гіпертонічна хвороба
- B** Ішемічна хвороба серця
- C** Ревматична хвороба
- D** Гострий міокардит
- E** Недостатність мітрального клапану

108

Пацієнт скаржиться на періодичні сезонні болі у епігастральній ділянці, які виникають через 15-20 хв. після вживання їжі. При якому захворюванні біль має такий характер?

- A** \* Виразкова хвороба шлунка
- B** Виразкова хвороба 12-палої кишки
- C** Дискінезія жовчовивідних шляхів
- D** Жовчокам'яна хвороба
- E** Хронічний гепатит

109

У пацієнта при обстеженні виявлено: біль у правому підребер'ї, асцит, "голова медузи", диспепсичні явища. Такий симптомокомплекс характерний для:

- A** \* Портального цирозу печінки
- B** Хронічного гепатиту
- C** Жовчокам'яної хвороби
- D** Хронічного холециститу
- E** Раку шлунка

110

Пацієнт 30 р., скаржиться на остуду, біль у поперековій ділянці тупого характеру, дизуричні явища, слабкість, головний біль. Об'єктивно: позитивний симптом Пастернацького. У сечі: піурія, протеїнурія, бактеріурія. Ці симптоми характерні для:

- A** \* Гострого пієлонефриту
- B** Гострого гломерулонефриту
- C** Хронічного гломерулонефриту
- D** Хронічного пієлонефриту
- E** Сечокам'яної хвороби

111

Жінка 48 р., скаржиться на слабкість, підвищену втомлюваність, задишку, серцебиття, сухість і пекучість язика, відчуття оніміння кінчиків пальців, повзання мурашок. Об'єктивно: шкіра лимонно-жовтяничного відтінку, РS – 96/хв., АТ – 100/60 мм рт. ст. Про яку анемію можна подумати?

- A** \* В<sub>12</sub>-дефіцитну анемію
- B** Залізодефіцитну анемію
- C** Апластичну анемію
- D** Гемолітичну анемію
- E** Постгеморагічну анемію

112

Пацієнтка 20р., в анамнезі з проявами харчової алергії, поступила на стаціонарне лікування з пневмонією. При введенні антибіотика цефамізіну розвинулись ознаки алергічної реакції: загальна слабкість, блідість шкіри, головокружіння, утруднене дихання, зниження АТ. Яке ускладнення розвинулось?

- A** \* Анафілактичний шок

- B** Кардіогенний шок
- C** Гемотрансфузійний шок
- D** Больовий шок
- E** Колапс

113

У пацієнтки з бронхіальною астмою виник приступ експіраторної задишки. Виберіть препарат для зняття приступу:

- A** \*Сальбутамол
- B** Супрастин
- C** Но-шпа
- D** Дімедрол
- E** Кордіамін

114

На територіях, де поширений ендемічний зоб, проводиться його профілактика. Який препарат для цього застосовується?

- A** \* Антиструмін
- B** Мерказоліл
- C** Тироксин
- D** Інсулін
- E** Гідрокортизон

115

Пацієнт скаржиться на біль оперізуючого характеру вище пупка, слабкість, блювання. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A** \* Панкреатиту
- B** Хронічного гепатиту
- C** Виразкової хвороби шлунка
- D** Цирозу печінки
- E** Холециститу

116

У пацієнтки К., 32 роки, після в/м ін'єкції ампіциліну через кілька хвилин з'явилася різка слабкість, відчуття стиснення в грудній клітці, жар у тілі, потемніння в очах. Шкіра бліда, вкрита липким холодним потом, пульс ниткоподібний, частий, АТ-60/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

- A** \* Анафілактичний шок
- B** Ангіоневротичний набряк
- C** Кардіогенний шок
- D** Бронхоспазм
- E** Набряк легенів

117

При дослідженні сечі пацієнтки виявлені бактеріурія, лейкоцитурія, протеїнурія. Для якого захворювання це характерно?

- A** \* Гострого пієлонефриту
- B** Гострого гломерулонефриту
- C** Хронічного гломерулонефриту
- D** Сечокам'яної хвороби
- E** Гострої ниркової недостатності

118

У пацієнта 25 років з сечокам'яною хворобою виник сильний приступоподібний біль в поперековій ділянці з іррадіацією в калитку, по ходу сечовода та статеві органи. Виберіть заходи для зняття приступу:

- A** \* Покласти теплу грілку на поперекову ділянку
- B** Покласти міхур з льодом на живіт
- C** Дати випити заспокійливі засоби
- D** Покласти теплу грілку на живіт
- E** -

119

На ФАП звернулася пацієнтка 45 років зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, оніміння 4 та 5 пальців лівої руки. Біль виникає після підняття по сходах на 3 поверх. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A** \*Стенокардії напруги
- B** Бронхіальної астми
- C** Стенокардії спокою
- D** Гіпертонічної кризи
- E** Ревматичної хвороби

120

Пацієнтка 32 роки, звернулася на ФАП зі скаргами на ниючий "голодний" біль в епігастральній ділянці, відрижку кислим, печію, схильність до закрепів. Для якого захворювання характерний цей симптомокомплекс?

- A** \*Виразкової хвороби 12- палої кишки
- B** Хронічного панкреатиту
- C** Хронічного холециститу
- D** Виразкової хвороби шлунка
- E** Хронічного коліту

121

У хворої 45 років з виразковим анамнезом під час підняття меблів в квартирі виник "кинжальний" біль в епігастрії, виражена слабкість, блювота. Шкірні покриви покриті холодним липким потом, АТ 90/50 мм рт.ст. Для якого стану це характерно?

- A** \*Перфорації виразки шлунка
- B** Гострого панкреатиту
- C** Гострого холециститу
- D** Пенетрації виразки шлунка
- E** Малігнізації виразки шлунка

122

Пацієнтка 32 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,5°C, біль у поперековій ділянці з обох сторін, часте й болісне сечовипускання. Об'єктивно: шкіра бліда, волога. Пульс 88/хв. АТ - 120/80 мм рт. ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох сторін. В аналізі сечі: сеча мутна, протеїнурія, лейкоцитурія, бактеріурія. Вкажіть захворювання, яке виникло у пацієнтки.

- A** \*Гострий пієлонефрит
- B** Гострий гломерулонефрит
- C** Сечокам'яна хвороба
- D** Хронічна ниркова недостатність
- E** Хронічний гломерулонефрит

123

Пацієнтка 40 років скаржиться на зниження пам'яті та працездатності, сонливість, випадіння волосся. Об'єктивно: сповільнена мова, голос низький, хриплий, Температура тіла – 35,1°C. Набряки локалізовані на обличчі, шиї. Риси обличчя грубі, набряклі повіки, звужені очні щілини, товсті ніс та губи. Пульс – 60/хв. АТ - 100/60 мм рт. ст. Тони серця ослаблені. Вкажіть захворювання, яке виникло у пацієнтки.

- A** \*Гіпотиреоз
- B** Тиреотоксикоз
- C** Ендемічний зоб

- D** Гломерулонефрит
- E** набряк Квінке

124

Пацієнтці 52 років надана невідкладна допомога: холод на надчеревну ділянку, введення вікасолу і дицинону, приймання всередину амінокапронової кислоти, антацидів, адсорбентів. Вкажіть ускладнення, при якому надається така невідкладна допомога.

- A** \*Шлункова кровотеча
- B** Пілоростеноз
- C** Малігнізація виразки шлунка
- D** Пенетрація виразки шлунка
- E** Перфорація виразки шлунка

125

У пацієнтки 45 років з жовчнокам'яною хворобою після фізичного навантаження раптово виникли сильний різкий біль в проекції жовчного міхура з іррадіацією у праве плече, шию, під праву лопатку, нудота, блювання. Об'єктивно: живіт здутий, при пальпації напруження передньої черевної стінки та болісність м'язів у ділянці правого підребер'я. Назвіть препарат, який застосовують для зняття болю.

- A** \*Баралгін
- B** Холензим
- C** Оксафенамід
- D** Ензистал
- E** Урсофальк

126

У пацієнтки 65 років, яка лікується з приводу раку легенів, виник кашель з виділенням пінистої крові світло-червоного забарвлення. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним липким потом. Пульс 96/хв. АТ 90/60 мм рт. ст. Назвіть препарат, який необхідно призначити пацієнтці для надання невідкладної допомоги.

- A** \*Хлорид кальцію
- B** Баралгін
- C** Еуфілін
- D** Солутан
- E** Теофілін

127

Пацієнтка 34 років скаржиться на підвищену збудливість, дратівливість, пітливість, відчуття жару, випадіння волосся, втрату маси тіла до 10 кг. Об'єктивно: екзофтальм, позитивний симптом Грефе. Щитоподібна залоза збільшена. Пульс 110/хв. Тремор рук. Назвіть тиреостатичний препарат для лікування пацієнтки.

- A** \*Мерказоліл
- B** Дийодтирозин
- C** Тиреоїдин
- D** Трийодтиронін
- E** Тироксин

128

У пацієнтки 22 років, яка перебуває на диспансерному обліку з приводу ревматичної лихоманки, з'явилися симптоми гострого респіраторного захворювання. Вкажіть препарат, який необхідно призначити для вторинної поточної профілактики ревматизму.

- A** \*Пеніцилін
- B** Бісептол
- C** Фуразолідон
- D** Фталазол
- E** Нітроксолін

129

Пацієнтці 38 років, яка перебувала у контакті з хворим на туберкульоз легенів, призначена хіміопрофілактика. Назвіть препарат, який призначають для специфічної профілактики туберкульозу.

- A** \*Ізоніазид
- B** Стрептоміцин
- C** Етіонамід
- D** Етамбутол
- E** Циклосерин

130

Жінка, 52 років, знаходиться в приймальному відділенні зі скаргами на гострий біль у ділянці серця тиснучого характеру, який віддає в ліву руку і триває понад 30 хвилин. Зі слів пацієнтки: приймала нітрогліцерин під язик тричі, але біль не вщухав. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \*Інфаркт міокарда
- B** набряк легень
- C** Стенокардія
- D** Серцева астма
- E** Бронхіальна астма

131

Пацієнт, 45 років, скаржиться на біль стискаючого характеру за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Після прийому нітрогліцерину напад припинився. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- A** \*Стенокардії
- B** Інфаркту міокарда
- C** Гіпертонічної хвороби
- D** Ревматизму
- E** Вади серця

132

У хворої 18 р., через два тижні після перенесеної ангіни, раптово виникли скарги на головний біль, набряк обличчя, зменшення виділення і кров'янисте забарвлення сечі. Об'єктивно: температура тіла 37,4<sup>0</sup>С, шкіра бліда, набряк повік. АТ-180/100 мм рт. ст. Аналіз сечі: білок - 2 г/л, еритроцити - 100 в полі зору. Про яке захворювання можна подумати?

- A** \*Гострий гломерулонефрит
- B** Гострий пієлонефрит
- C** Хронічний гломерулонефрит
- D** Хронічний пієлонефрит
- E** Гострий цистит

133

Пацієнтка 46 р. скаржиться на частий головний біль, шум у вухах, інколи – запаморочення, нудоту. Акушерка виявила, що артеріальний тиск при вимірюванні складає 160/100 мм рт. ст. Дані симптоми є характерними для:

- A** \* Артеріальної гіпертензії
- B** Ішемічної хвороби серця
- C** Серцевої недостатності
- D** Судинної недостатності
- E** Залізодефіцитної анемії

134

У чоловіка 32 р. скарги на кашель з виділенням харкотиння слизового характеру, підвищення температури тіла до 37,3<sup>0</sup>С, слабкість, пітливість. Хворіє 3 дні. Під час



перкусії грудної клітки над легеньми ясний легеневиий звук. При аускультатції: жорстке дихання, сухі хрипи. Ro - дослідження легень: паталогічних змін не виявлено. Про яке захворювання можна подумати?

- A** \* Гострий бронхіт
- B** Хронічний бронхіт
- C** Бронхіальна астма
- D** Сухий плеврит
- E** Пневмонія

135

У хворої К. 30 років періодично повторюються напади експіраторної задишки. Під час мікроскопічного дослідження в харкотинні виявлені спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Про яке захворювання можна подумати?

- A** \* Бронхіальну астму
- B** Гострий бронхіт
- C** Хронічний бронхіт
- D** Рак легенів
- E** Ексудативний плеврит

136

Пацієнт скаржиться на тупий біль в поперековій ділянці справа, болючість під час сечовипускання, гарячку, загальну слабкість. Об'єктивно: температура тіла 38,8°C; симптом Пастернацького позитивний справа. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A** \*Пієлонефриту
- B** Гломерулонефриту
- C** Циститу
- D** Холециститу
- E** Сечокам'яної хвороби

137

Хвора А. 35 років скаржиться на сильний біль у правому підребер'ї, що іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту і блювання. Об'єктивно: живіт здутий, пальпаторно - напруженість передньої черевної стінки в ділянці правого підребер'я. Позитивний симптом Ортнера. УЗД – наявність конкрементів в жовчному міхурі. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?

- A** \*Жовчнокам'яної хвороби
- B** Гострого холециститу
- C** Виразкової хвороби 12-палої кишки
- D** Гострого панкреатиту
- E** Гострого гастриту

138

У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Який препарат необхідно використати для обколуювання місця введення ліків при наданні невідкладної допомоги?

- A** \*Адреналін
- B** Анальгін
- C** Дібазол
- D** Но-шпу
- E** Дицинон

139

Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, гіпертонус м'язів. АТ-120/80 мм. рт. ст. Яке ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?

- A** \*Гіпоглікемічна кома

- B** Гіперосмолярна кома
- C** Молочнокисла кома
- D** Гіперглікемічна кома
- E** Церебральна кома

140

У пацієнтки 40 р., виникли інтенсивний біль у правому підребер'ї, який іррадіює в праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Позитивні симптоми Ортнера, Мерфі. Про яке захворювання свідчать дані ознаки?

- A** \* Гострий холецистит
- B** Сечокам'яну хворобу
- C** Гострий панкреатит
- D** Виразкову хворобу шлунка
- E** Виразкову хворобу 12-палої кишки

141

У хворої на бронхіальну астму почався сухий кашель, виникла гостра нестача повітря, дихання утруднилось, видих здійснюється зі свистом і чути на віддалі. Які препарати використовує для надання невідкладної допомоги?

- A** \* 10 мл 2,4% розчину еуфіліну
- B** 1 мл 0,05% розчину строфантину
- C** 1 мл 0,06% розчину корглікону
- D** 4 мл 1% розчину дибазолу
- E** 10 мл 40% розчину глюкози

142

У пацієнтки 43 років з гіпертонічною хворобою виник сильний головний біль, запаморочення, блювання, мерехтіння "мушок" перед очима, АТ 195/100 мм рт ст. Який лікарський препарат використовує для надання невідкладної допомоги ?

- A** \* 25% розчину магнію сульфату
- B** 0,05% розчину строфантину
- C** 3% розчину преднізолону
- D** 1% розчину мезатону
- E** 1% розчину димедролу

143

На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на напад сильного головного болю, серцебиття, нудоту, блювання. Гіперемія шкіри обличчя, тремтіння всього тіла. Ps -100/хв., АТ – 240/120 мм рт. ст., межі серця розширені, тони ослаблені, акцент II тону над аортою. Вкажіть, яке ускладнення виникло.

- A** \* Гіпертензивна криза
- B** Серцева астма
- C** набряк легень
- D** Гостра судинна недостатність
- E** -

144

У хворої, 50 років, раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, який іррадіює на внутрішню поверхню стегна і в статеві органи, біль при сечовипусканні. Дані симптоми, характерні для:

- A** \* Ниркової кольки
- B** Печінкової кольки
- C** Гострого апендициту
- D** Гострого холецистити
- E** Гострого панкреатиту

145

На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на слабкість, пітливість вночі, сухий кашель,  $t$  37,4-37,6°C. Хворіє 4 тижні. В анамнезі - контакт із хворим на туберкульоз легенів. На яке дослідження Ви направите пацієнтку в першу чергу?

- A** \*Рентгенологічне дослідження легенів
- B** Спірометрію
- C** Загальний аналіз крові
- D** Біохімічний аналіз крові
- E** Електрокардіографію

146

До Вас звернулась пацієнтка зі скаргами на задишку з утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною. При огляді грудна клітка у положенні максимального вдиху, жінці важко відповідати на запитання. При перкусії над грудною кліткою визначається коробковий звук, аускультативно – дихання послаблене, сухі розсіяні свистячі хрипи. Ваш діагноз?

- A** \* Бронхіальна астма
- B** Гострий бронхіт
- C** Пневмонія
- D** Серцева астма
- E** Стенокардія

147

Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернулась пацієнтка 48 років, яка протягом 15 років хворіє жовчнокам'яною хворобою. Який метод дослідження підтверджує дане захворювання?

- A** \* УЗД органів черевної порожнини
- B** Дуоденальне зондування
- C** Шлункове зондування
- D** Колоноскопія
- E** Іригоскопія

148

У пацієнта з інфарктом міокарда з'явилися ознаки гострої лівошлуночкової недостатності. Яке положення тіла слід надати пацієнту:

- A** \* Сидяче з опущеними ногами
- B** Горизонтальне
- C** Горизонтальне з припіднятими нижніми кінцівками
- D** Горизонтальне на правому боці
- E** Горизонтальне на лівому боці

149

У хворого задишка при фізичному навантаженні, серцебиття. При обстеженні: акроціаноз, над легенями вологі хрипи, діяльність серця аритмічна, тони послаблені, пульс 100 /хв., АТ 170/95 мм рт. ст. Який патологічний стан у хворого?

- A** \* Хронічна серцева недостатність
- B** Серцева астма
- C** набряк легенів
- D** Непритомність
- E** Колапс

150

У хворого раптово виникли блювання "кавовою гущею", блідість. АТ 90/70 мм рт.ст.,холодний липкий піт. Який попередній діагноз?

- A** \* Шлункова кровотеча
- B** Проривна виразка
- C** Пенетрація

- D** Малігнізація
- E** Стеноз ворота

151

Ви проводите санітарно-освітню бесіду з питань онкології серед населення. Яке з питань найбільш актуальне для профілактики раку легенів?

- A** \*Боротьба з курінням
- B** Раціональне харчування
- C** Боротьба з ожирінням
- D** Боротьба з гіподинамією
- E** Запобігання алергії

152

До Вас на ФАП звернулася пацієнтка, яку непокоїть важкість у правому підребір'ї, втомлюваність. При об'єктивному обстеженні виявили жовтяницю, на шкірі "судинні зірочки", гепатомегалію. Вкажіть попередній діагноз.

- A** \*Цироз печінки
- B** Хронічний гепатит
- C** Хронічний панкреатит
- D** Хронічний холецистит
- E** Хронічний гастрит

153

Ви – акушерка ФАПу надаєте допомогу вагітній 35 років, яка страждає на гіпертонічну хворобу. Вкажіть препарат, який слід ввести вагітній жінці при гіпертонічній кризі.

- A** \*Розчин сульфату магнію
- B** Розчин аміназину
- C** Розчин строфантину К
- D** Розчин еуфіліну
- E** Розчин атропіну сульфату

154

До вас на ФАП звернулася пацієнтка 52 років зі скаргами на кашель з кровохарканням. Для надання невідкладної допомоги необхідно використати:

- A** \*Міхур з льодом
- B** Грілку
- C** Гірчичники
- D** Банки
- E** Кишеньковий інгалятор

155

Ви – акушерка ФАПу. До вас звернулася вагітна жінка 25 років яка страждає на залізодефіцитну анемію. Дайте пораду, які продукти повинні обов'язково входити в раціон вагітної з анемією:

- A** \*М'ясо, риба
- B** Фрукти, морозиво
- C** Солодощі, копчене
- D** Молочні, бобові
- E** Пшеничні висівки, чай

156

Під час обстеження пацієнтки запідозрено розвиток сухого плевриту. Яка аускультативна ознака підтвердить його діагноз?

- A** \* Шум тертя листків плеври
- B** Крепітація
- C** Амфоричне дихання

- D** Бронхіальне дихання
- E** Сухі хрипи

157

У пацієнтки К., 27 років напад бронхіальної астми триває вже протягом доби і не купірується еуфіліном і платифіліном, які раніше були ефективними. Яке найбільш вірогідне ускладнення розвинулось у пацієнтки?

- A** \* Астматичний статус
- B** Гостра судинна недостатність
- C** Гостра дихальна недостатність
- D** Гостра серцева недостатність
- E** -

158

У пацієнтки з пневмонією, на фоні лікування антибіотиками розвинулась криза: температура тіла знизилась протягом 2-х годин з 40,3°C до 36,2°C. При цьому самопочуття погіршилось; пацієнтка зблідла, вкрилась холодним потом, скаржиться на слабкість, потемніння в очах, АТ-70/40 мм рт.ст., Р-ниткоподібний 100/хв. Яке ускладнення найбільш вірогідне в даному випадку?

- A** \* Колапс
- B** Непритомність
- C** Кардіогенний шок
- D** Гостра серцева недостатність
- E** -

159

Жінці 36 років, що знаходиться на диспансерному обліку, проводиться цілорічна профілактика ревматизму. "Біцилін-5" їй треба вводити внутрішньом'язово:

- A** \* 1 раз на місяць по 1,5 млн ОД
- B** 2 рази на місяць по 1 млн ОД
- C** 3 рази на місяць по 600 тис ОД
- D** 1 раз на тиждень по 500 тис ОД
- E** 2 раз на тиждень по 300 тис ОД

160

Акушерку покликали до вагітної жінки, яка в задушливому приміщенні знепритомніла. Надайте долікарську допомогу:

- A** \* Укласти горизонтально з припіднятими ногами
- B** Укласти горизонтально з припіднятою головою
- C** Накласти джгути на кінцівки
- D** Зробити штучне дихання
- E** Зробити непрямий масаж серця

161

Пацієнтку 56 років, турбує головний біль в ділянці потилиці, нудоту. Об'єктивно: гіперемія обличчя, ЧД-20/хв, Рс-98 уд/хв, ритмічний, АТ-200/105 мм рт.ст. З чого почати невідкладну допомогу?

- A** \* Клофеліну
- B** Анальгіну
- C** Нітрогліцерину
- D** Кордіаміну
- E** Строфантину

162

Робітниця фабрики зі скаргами на нудоту, блювання, болі переймистого характеру в животі, слабкість. Стан погіршився через 3 години після обіду у фабричній їдальні.

Надайте невідкладну долікарську допомогу?

- A** \* Промити шлунок
- B** Викликати швидку допомогу
- C** Відправити додому
- D** Зробити ін'єкцію лазіксу
- E** Міхур з льодом на ділянку епігастрія

163

Хворий 43 років, який 7 років хворіє на виразкову хворобу шлунка. Щорічно виникають рецидиви. Консервативне лікування не ефективне. Втрачає масу тіла. Скарги на стискаючий біль в епігастральній ділянці після їди, постійну нудоту, відрижку тухлим, часте блювання неперетравленою їжею. Яке ускладнення виразкової хвороби?

- A** \* Пілоростеноз
- B** Перфорація
- C** Пенетрація
- D** Малігнізація
- E** -

164

Пацієнт К. 38 років, скаржиться на блювання, блювотні маси у вигляді "кавової гущі". Хворий кволий, блідий, вкритий холодним потом. З анамнезу відомо, що восени і навесні періодично з'являються болі в епігастральній ділянці тісно пов'язані з вживанням їжі. Ваш найбільш вірогідний діагноз?

- A** \* Виразкова хвороба шлунка ускладнена кровотечею
- B** Виразкова хвороба шлунка ускладнена перфорацією
- C** Хронічний холецистит
- D** Хронічний гастрит
- E** Рак шлунка, ускладнений кровотечею

165

У вагітної жінки з'явилися скарги на зниження працездатності, запаморочення, задишку, печію та біль в язиці, біль в ногах. Об'єктивно: блідо-рожевий колір шкіри, "лакований" язик з атрофією сосочків. Чим ви порадите жінці збагатити раціон?

- A** Печінкою
- B** Макаронними виробами
- C** Смородиною
- D** Молочними продуктами
- E** Солодощами

166

Пацієнтці, хворій на інсулінозалежний цукровий діабет, було введено інсулін. Через деякий час вона втратила свідомість, посилилось потовиділення, з'явилися судоми. Яка кома виникла у пацієнтки?

- A** \* Гіпоглікемічна
- B** Гіперглікемічна
- C** Кетоацидотична
- D** Гіперосмолярна
- E** Тиреоїдна

167

На ФАП звернулась вагітна, яка 4 роки тому прооперована з приводу дифузного токсичного зобу. Скаржиться на загальну слабкість, сонливість, погіршення пам'яті, мерзлякуватість. При обстеженні: обличчя набрякле, очні щілини звужені, шкіра на дотик суха, холодна, волосся рідке, щитоподібна залоза не пальпується. Який ймовірний діагноз в даному випадку?

- A** \* Гіпотиреоз
- B** Дифузний токсичний зоб

- C* Хвороба Аддісона
- D* Цукровий діабет
- E* Хронічний пієлонефрит

168

Ви акушерка ФАПу. Через два тижні після перенесеної ангіни до вас звернулася пацієнтка із скаргами на ранкові набряки обличчя, головний біль розпираючого характеру. Сеча кольору "м'ясних помиїв", підвищення АТ до 170/100 мм рт.ст. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.

- A* \*Гострий дифузний гломерулонефрит
- B* Артеріальна гіпертензія
- C* Гострий пієлонефрит
- D* Сечокам'яна хвороба
- E* Хронічний пієлонефрит

169

На ФАП звернулася вагітна, терміном вагітності 22 тижнів, протягом двох днів турбує підвищена температура тіла до 37,2°C та сухий кашель. Вкажіть ймовірний діагноз:

- A* \*Гострий бронхіт
- B* Хронічний бронхіт
- C* Пневмонія
- D* Бронхіальна астма
- E* Плеврит

170

На ФАП звернувся пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, кровотечу із носа і ясен, крововиливи на шкірі, біль у горлі при ковтанні (виразково-некротичні зміни), підвищення  $t$  – 39°C, збільшення лімфовузлів. В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A* \*Гострий гемобластоз
- B* Гіпопластична анемія
- C* В-12 дефіцитна анемія
- D* Апластична анемія
- E* -

171

Вагітна 38 років звернулася на ФАП. Скаржиться на інтенсивний пекучий біль за грудиною, який іррадіює в ліве плече і руку, триває 6 - 8 годин. Який метод діагностики застосовують для підтвердження діагнозу?

- A* \*Електрокардіографія
- B* Фонокардіографія
- C* Електроенцефалографія
- D* Спірометрія
- E* Сфігмографія

172

До акушерки ФАПу звернувся пацієнт 40 років, у якого після видалення щитоподібної залози, з'явилися сонливість, зниження АТ, закрепи, щільні набряки на обличчі. Встановлено діагноз: гіпотиреоз. Який препарат відноситься до замісної терапії.?

- A* \*L- тироксин
- B* Мерказоліл
- C* Інтерферон
- D* Р-н Люголя
- E* Адреналін

173

Ви акушерка ФАПу. Вас викликали до пацієнтки 20 р., яка скаржиться на біль в епігастральній ділянці живота, нудоту, блювання залишками їжі. Самопочуття погіршилось 2 години тому, після вживання недоброякісної їжі. Який стан виник у пацієнтки?

- A** \*Гострий гастрит
- B** Хронічний гастрит
- C** Виразкова хвороба шлунка
- D** Гострий панкреатит
- E** Гострий холецистит

174

Пацієнт госпіталізований до гематологічного відділення з підозрою на гострий лейкоз. Який метод обстеження має важливе діагностичне значення:

- A** \*Пункція червоного кісткового мозку
- B** Плевральна пункція
- C** Біохімічне дослідження крові
- D** Коагулограма
- E** Бактеріологічне дослідження крові

175

Ви акушерка ФАПу, до Вас звернувся хворий М., 49 років зі скаргами на кашель, виділенням гнійного, з неприємним запахом харкотиння “повним ротом” частіше у ранковий час, підвищення температури тіла до 38,6<sup>0</sup>С. Про яке захворювання йде мова ?

- A** \*Бронхоектатичну хворобу
- B** Бронхіальну астму
- C** Рак легенів
- D** Туберкульоз легенів
- E** Пневмонію

176

Ви акушерка ФАПу, до Вас звернувся хворий 68 років зі скаргами на кашель з виділенням харкотиння у вигляді “малинового желе”, зниження апетиту, схуднення на 15 кг за останні півроку, задишку, що посилюється при фізичному навантаженні. З анамнезу відомо, що хворий палить ~ 30 років. Який попередній діагноз можна поставити хворому?

- A** \*Рак легені
- B** Бронхоектатична хвороба
- C** Пневмонія
- D** Туберкульоз легенів
- E** Бронхіальна астма.

177

Хвора скаржиться на спрагу, сухість в роті, поліурію, втрату маси тіла, свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів. Яке дослідження необхідно призначити хворій?

- A** \* Аналіз крові на глюкозу
- B** Загальний аналіз крові
- C** Аналіз крові на азотисті сполуки
- D** Аналіз сечі на амілазу
- E** -

178

Пацієнтка скаржиться на схуднення (10 кг. за останній місяць), відрижку тухлими яйцями, постійну біль в епігастрії, відразу до м'яса. Аналіз калу на приховану кров, реакція – позитивна; при езофагогастродуоденоскопії з біопсією виявлено атипові клітини. Про яке захворювання може іти мова?

- A** \* Рак шлунку
- B** Виразкову хворобу шлунку
- C** Хронічний гастрит



- D** Хронічний гепатит
- E** Виразкову хворобу 12-палої кишки

179

У хворого з виразковою хворобою шлунка виникли ознаки шлункової кровотечі: блювання у вигляді "кавової гущі", дьогтеподібні випорожнення. Який препарат необхідно підготувати для невідкладної допомоги?

- A** \* Дицинон
- B** Альмагель
- C** Анальгін
- D** Атропін
- E** Промедол

180

У жінки через 30 хв. після вживання шоколаду на шкірі з'явилась висипка розміром просяного зерна, свербіж, підвищення температури до 38°, головний біль, нездужання. Для якої хвороби характерні такі ознаки?

- A** \* Кропив'янки
- B** Набряку Квінке
- C** Дерматиту
- D** Анафілактичного шоку
- E** Піодермії