

1

У вагітної нефропатія другої половини вагітності. Вкажіть, яка дієта доцільна при даній патології:

- A** \*7
- B** 10
- C** 11
- D** 9
- E** 8

2

Вкажіть, який із методів дослідження не відноситься до ендоскопічних:

- A** \*Іригоскопія
- B** Цистоскопія
- C** Бронхоскопія
- D** Ректороманоскопія
- E** Колоноскопія

3

До стаціонару на лікування поступає вагітна з терміном вагітності 18 тижнів. Вкажіть, який документ повинна заповнити акушерка?

- A** \*Медична картка стаціонарного хворого
- B** Історія пологів
- C** Обмінна карта вагітності
- D** Статистичний талон
- E** Листок лікарських призначень

4

Акушерка проводить туалет зовнішніх статевих органів породіллі за допомогою (корнцанга із серветкою).

Вкажіть, який із антисептичних розчинів вона використає?

- A** \*Розчин калію перманганату 1:10000
- B** 40% етилового спирту
- C** 3% розчин пероксиду водню
- D** Перевареною водою
- E** Дистильовану водою

5

Вкажіть режим стерилізації медичного інструментарію повітряним методом

- A** \*180<sup>0</sup> – 60хв
- B** 180<sup>0</sup> – 30хв
- C** 160<sup>0</sup> – 130хв
- D** 180<sup>0</sup> – 45хв
- E** 160<sup>0</sup> – 60хв

6

У породіллі протягом тижня відмічались добові коливання температури в межах 4-5 0С . Визначте тип гарячки.

- A** \*Гектична
- B** Постійна
- C** Хвилеподібна
- D** Поворотна
- E** Інтермітуюча

7

У приймальне відділення поступила вагітна з педикульозом. Вкажіть, який протипедикульозний засіб ви застосуєте?

- A** \*Механічний метод
- B** Карбофос
- C** Мильно-сольвентова емульсія
- D** Сірчана мазь
- E** Оцтова кислота

8

Після введення антибіотика у пацієнтки відмічається свербіж, почервоніння, набряк в місці ін'єкції. Вкажіть, який стан виник в пацієнтки?

- A** \*Алергічна реакція
- B** Медикаментозна емболія
- C** Інфільтрат
- D** Некроз тканин
- E** Пірогенна реакція

9

В пацієнтки, яка знаходиться на ліжковому режимі, спостерігається стійка гіперемія та часткове відшарування шкіри попереково-крижової ділянки. Дайте оцінку пролежня:

- A** \*II ступінь
- B** I ступінь
- C** V ступінь
- D** IV ступінь
- E** III ступінь

10

За наявності в пацієнтки алергічних реакцій для стимуляції секреції шлунка необхідно призначити такий засіб:

- A** \*Пентагастрин
- B** Дімедрол
- C** Гістамін
- D** Кофеїн
- E** Магнію сульфат

11

Акушерка жіночої консультації роз'яснює жінці правила вимірювання базальної температури. На яку довжину треба ввести термометр в пряму кишку?

- A** \*3 – 4 см
- B** 5 – 6 см
- C** 7 – 8 см
- D** 1 – 2 см
- E** 4 - 5 см

12

В пологовому будинку знаходиться жінка після кесарського розтину на ліжковому режимі. Одягати сорочку пацієнтці треба в такій послідовності:

- A** \*Одягати спочатку на руки, потім на голову
- B** Одягати спочатку на голову, потім на руки
- C** По бажанню пацієнтки
- D** Як зручніше медперсоналу
- E** Одночасне одягання рук і голови

13

В гінекологічному відділенні знаходиться жінка після операції з приводу позаматкової вагітності. Що необхідно застосувати з метою профілактики кровотечі:

- A** \*Міхур з льодом
- B** Холодний компрес
- C** Холодну примочку
- D** Грілку
- E** Сухе тепло

14

Породіллі акушерка приклала на живіт міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти:

- A** \*Через 20 – 30 хв.
- B** Через 10 – 15 хв.
- C** Через годину
- D** Доти, поки не розтане лід
- E** Через 5 – 10 хв.

15

У породіллі, 25 років, після кесарського розтину виникла затримка сечі понад 6 годин. Які заходи слід застосувати в першу чергу?

- A** \*Рефлекторно викликати акт сечовиділення
- B** Промити сечовий міхур
- C** Ввести лікарські засоби у сечовий міхур
- D** Поставити гірчичники на гомілки
- E** Поставити холодний компрес на гомілки

16

Ви акушерка ФАПу, вночі Вас покликали до пацієнтки з бронхіальною астмою у якої виникли відчуття нестачі повітря, задишка. Об'єктивно : положення сидяче, опираючись руками на стілець.

Вкажіть шлях введення 5 мл 2% розчину еуфіліну:

- A** \*Внутрішньовенно
- B** Внутрішньом'язово
- C** Внутрішньоартеріально
- D** Підшкірно
- E** Внутрішньошкірно

17

Акушерка жіночої консультації пояснює вагітній жінці, що після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вона повинна зібрати середню порцію сечі в чисту, суху банку. Вкажіть метод дослідження сечі?

- A** \* За методом Нечипоренко
- B** Сеча на цукор
- C** Сеча на діастазу
- D** За методом Зимницького
- E** За методом Амбурже

18

Пацієнтці, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу “загрози переривання вагітності”, лікар призначив дослідження сечі за методом Зимницького.

Вкажіть мету даного дослідження?

- A** \*Дослідження видільної і концентраційної функції нирок
- B** Визначення кількості формених елементів в осаді сечі
- C** Визначення амілази
- D** Визначення цукру в сечі
- E** Визначення добового діурезу

19

Породіллі з цукровим діабетом призначено введення 20 ОД інсуліну. У вас флакони по 100 ОД інсуліну в 1 мл. Скільки мл інсуліну необхідно набрати в шприц 2 мл?

- A** \*0,2 мл
- B** 0,5 мл
- C** 0,4 мл
- D** 1мл
- E** 2 мл

20

Ви акушерка гінекологічного відділення. Хворій 45 років після операції з приводу фіброміоми матки призначено підшкірне введення 1 мл 1\% розчину промедолу. В якому документі реєструється введення призначеного препарату?

- A** \*Журналі обліку наркотичних засобів
- B** Журналі передачі чергування
- C** Стационарному журналі
- D** Медичній карті стационарного хворого
- E** Журналі поступаючих хворих

21

У породіллі, в післяопераційному періоді виник закреп. Лікар призначив пацієнтці олійну клізму.

Вкажіть кількість олійного розчину та температуру.

- A** \*150 – 200 мл, 37 – 38°C
- B** 50 – 100 мл, 40 – 42°C
- C** 100 – 150 мл, 30 – 35°C
- D** 150 мл, 34 – 35°C
- E** 500 мл, 20 – 30°C

22

Породілля не може здійснити акт сечовиділення протягом 12 годин. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Яку першочергову допомогу необхідно надати жінці?

- A** \*Здійснити катетеризацію сечового міхура
- B** Покласти грілку на низ живота
- C** Дати тепле питво
- D** Ввести постійний катетер
- E** Ввести спазмолітики

23

Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно застосувати для проведення обробки?

- A** \*0,25% емульсія декрезилу
- B** Шампунь "Педикулін"
- C** Лосьйон "Ланцид"
- D** Оцтова кислота
- E** 0,15% емульсія карбофосу

24

Під час приймання пологів в око акушерці потрапила навколоплідна вода.

Які подальші дії акушерки?

- A** \*Промити око проточною водою
- B** Закрапати око розчином борної кислоти
- C** Промити око дистильованою водою
- D** Промити око блідо-рожевим розчином калію перманганату
- E** Закрапати око відваром ромашки

Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботі стерильну білизну з бікса. Вкажіть, протягом якого часу зберігається стерильність матеріалу в даному біксі?

- A** \*6 годин
- B** 10 годин
- C** 12 годин
- D** 24 години
- E** 48 годин

26

Жінці необхідно здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Вкажіть, який інструмент повинна підготувати акушерка?

- A** \*Корнцанг
- B** Голкоутримувач
- C** Затискач Кохера
- D** Цапки для білизни
- E** Жолобоподібний зонд

27

Хворій гінекологічного відділення лікар призначив ректальне вимірювання температури вранці та ввечері. Вкажіть, протягом якого часу акушерка повинна виміряти температуру ректально:

- A** \*5 хв.
- B** 2 хв.
- C** 7 хв.
- D** 10 хв.
- E** 15 хв.

28

Після вимірювання температури хворим, акушерка здійснює дезінфекцію медичних термометрів. Вкажіть, який дезінфікуючий розчин використає акушерка?

- A** \*0,2% дезактин
- B** 5% розчин хлорного вапна
- C** 33% розчин перекису водню
- D** 0,3% хлораміну
- E** 0,5% хлоргекседин

29

Хворій гінекологічного відділення лікар призначив щогодини визначати пульс. Які властивості пульсу повинна визначити акушерка?

- A** \*Частоту, ритм, наповнення, напруження
- B** Частоту, напруження, висоту
- C** Пульсові коливання, наповнення
- D** Ритм, швидкість, висоту,
- E** Швидкість, наповнення

30

Породіллі одразу після пологів акушерка приклала на низ живота міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?

- A** \*Через 30 хв.
- B** Доки, поки не розтане лід.
- C** Через 10 хв.
- D** Через годину
- E** Через 20 хв.

31

У вагітної 36 неділь після вимірювання артеріального тиску, акушерка ФАПу, відмічає

зміни показників артеріального тиску. Вкажіть показники артеріальної гіпертензії.

- A** \*140/90 мм. рт. ст.
- B** 100/50 мм. рт. ст.
- C** 110/60 мм. рт. ст.
- D** 120/70 мм. рт. ст.
- E** 130/80 мм. рт. ст.

32

Вагітній з набряковим синдромом лікар призначив визначення водного балансу.

Що необхідно врахувати для цього акушерці.

- A** \*Кількість вживаної рідини й виділеної сечі за добу
- B** Кількість виділеної сечі за добу
- C** Кількість виділеної сечі за день
- D** Кількість виділеної сечі за ніч
- E** Кількість виділеної сечі за кожні 3 години

33

Хворій на цукровий діабет потрібно ввести за допомогою шприца ємкістю 2 мл 24 МО інсуліну [1 мл. інсуліну містить 40 МО]. Скільки інсуліну необхідно набрати в шприц:

- A** \*0,6 мл
- B** 0,1 мл
- C** 0,2 мл
- D** 0,3 мл
- E** 0,5 мл

34

Породіллі призначено промивання сечового міхура. Скільки дезінфікуючого розчину повинна ввести акушерка під час промивання?

- A** \*200-300 мл
- B** 100 - 200 мл
- C** 400-500 мл
- D** 500-600 мл
- E** 900-1000 мл

35

Після пологів пацієнтці з гострою затримкою сечі лікар призначив катетеризацію сечового міхура. Чим повинна обробити катетер акушерка перед введенням його в сечівник?

- A** \*Стерильним гліцерином
- B** Розчином фурациліну
- C** Розчином натрію хлориду
- D** Антисептичним розчином
- E** Рідким вазеліном

36

У пацієнтки 30 років, яка знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні, гостра затримка сечі. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Вкажіть подальші дії акушерки?

- A** \*Здійснити катетеризацію сечового міхура
- B** Промити сечовий міхур
- C** Дати тепле пиття
- D** Покласти грілку на низ живота
- E** Ввести постійний катетер

37

Породіллі М. після пологів лікар призначив внутрішньом'язові ін'єкції олійного розчину. Акушерка перед набиранням розчину в шприц не підігріла його. На 3 день в місці ін'єкції утворилось ущільнення і біль при пальпації.

Вкажіть, яке ускладнення виникло після ін'єкції?

- A** \*Інфільтрат
- B** Некроз
- C** Медикаментозна емболія
- D** Алергійна реакція
- E** Гематома

38

У жінки після пологів виник стійкий закреп. Вкажіть, яку клізму використовує акушерка за призначенням лікаря?

- A** \*Олійну
- B** Очисну
- C** Сифонну
- D** Живильну
- E** Краплинну

39

У пацієнтки з вадою серця, лікар призначив акушерці підрахувати кількість дихальних рухів. Частота дихання становить 30/хв. Вкажіть, що спостерігається у пацієнтки.

- A** \*Тахіпное
- B** Брадипное
- C** Апноє
- D** Диспноє
- E** Ядуха

40

В приймальне відділення лікарні прибула вагітна С. для планової госпіталізації. Пацієнтка потребує санітарної обробки. Вкажіть, вид санітарної обробки?

- A** \*Повна (душ)
- B** Повна (гігієнічна ванна)
- C** Часткова(обтирання)
- D** Спеціальна
- E** Відмова від санітарної обробки

41

Пацієнтка 26 років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з загостренням ревматизму скаржиться на приступи серцебиття. Лікар призначив контролювати пульс. Вкажіть судину, яку найчастіше використовують для дослідження пульсу?

- A** \*Променева артерія
- B** Стегнову артерія
- C** Скроневу артерія
- D** Підколінна артерія
- E** Сонна артерія

42

Підчас внутрішньовенної ін'єкції акушерка випадково ввела 10% розчин хлористого кальцію під шкіру. Які подальші дії акушерки?

- A** \*Припинити введення, обколоти місце ін'єкції 0,1% розчином адреналіну
- B** Накласти джгут вище місця ін'єкції
- C** В місце ін'єкції ввести 0,9% розчин натрію хлориду 5-8 мл.
- D** Покласти грілку
- E** Продовжити введення 10% розчину кальцію хлориду

43

Метод дезінфекції, який включає в себе використання дії високих і низьких температур, променевих засобів та механічний вплив називається:

- A** \*Фізичний
- B** Хімічний
- C** Механічний
- D** Спеціальний
- E** Загальний

44

Для якого рентгенологічного дослідження готують контрастну суміш, яка складається із сульфату барію (із розрахунку 400 г порошку на 1,6 л води) і 10 г таніну?

- A** \*Іригоскопії
- B** Урографії ретроградна
- C** Холецистографії
- D** Бронхографії
- E** Урографії екскреторна

45

При проведенні санітарного оброблення хворих на педикульоз потрібно користуватись наказом МОЗ України від 28.07.1994р. "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом". Вкажіть номер чинного наказу.

- A** \*38
- B** 120
- C** 365
- D** 408
- E** 720

46

Окремо в скількох примірниках старша акушерка виписує готові, екстемпоральні лікарські форми, перев'язувальний матеріал та предмети догляду за хворими?

- A** \*в трьох
- B** в одному
- C** в двох
- D** в чотирьох
- E** в п'яти

47

Після припинення внутрішньовенного уведення розчину, акушерка накладає на місце ін'єкції стерильний ватний тампон, видаляє голку із вени, місце ін'єкції притискає на 5 хв. Для попередження, якого ускладнення виконуються дані дії акушеркою.

- A** \*гематоми
- B** інфільтрату
- C** повітряної емболії
- D** непритомності
- E** пірогенної реакції

48

В якій кількості закрапують в око розчин антибіотика другого розведення для проведення кон'юнктивальної проби.

- A** \*1-2 краплі
- B** 3-4 краплі
- C** 4-5 краплі
- D** 5-6 крапель
- E** 6-8 крапель

49

Пацієнтці з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу призначено дослідження калу на приховану кров. Вкажіть, яку кількість калу необхідно взяти для дослідження.



- A** \*5-10г калу
- B** 1-3г калу
- C** 3-4г калу
- D** 11-15г калу
- E** 15-20г калу

50

Перед набиранням олійного розчину у шприц, акушерка підігріває на водяній бані ампулу до температури:

- A** \*36-37<sup>0</sup>C
- B** 39-40<sup>0</sup>C
- C** 34-36<sup>0</sup>C
- D** 25-30<sup>0</sup>C
- E** 20-25<sup>0</sup>C

51

Для приготування 1 л 0,2% розчину дезактину необхідно взяти сухої речовини:

- A** \*2 г
- B** 10 г
- C** 15 г
- D** 20 г
- E** 50 г

52

Зазначте тривалість стерилізації під тиском 2 атм при температурі 132<sup>0</sup>C

- A** \*20 хв
- B** 15 хв
- C** 45 хв
- D** 60 хв
- E** 120 хв

53

Пацієнтці з підозрою на туберкульоз, лікар призначив дослідження харкотиння на мікобактерії. Вкажіть, протягом якого часу необхідно збирати харкотиння.

- A** \*1 – 3 доби
- B** 10 діб
- C** Будь – який час
- D** За 3 год
- E** Одноразово вранці

54

Пацієнтці для знеболення призначені наркотичні анальгетики. Вкажіть, як часто старша акушерка виписує наркотичні препарати:

- A** \*1 раз на 3 дні
- B** щодня
- C** 1 раз на тиждень
- D** 1 раз на 10 днів
- E** 1 раз на місяць

55

Для графічного запису показників артеріального тиску акушерка використовує температурний листок. Вкажіть ціну поділки артеріального тиску:

- A** \*5 мм рт.ст.
- B** 1 мм рт.ст.
- C** 2 мм рт.ст.
- D** 3 мм рт.ст

**E** 4 мм рт.ст

56

В приймальне відділення лікарні доправлено пацієнтку з блюванням "кавовою гущею".  
Вкажіть вид транспортування у відділення.

- A** \*На каталці - ношах
- B** На кріслі – каталці
- C** Ліфтом
- D** Сомостійною ходою
- E** Пішки з медсестрою

57

У пацієнта з туберкульозом легень було виявлено кровохаркання. Вкажіть, яке положення найбільш доцільно надати пацієнту.

- A** \*Напівсидяче
- B** Лежаче
- C** Лежаче на правому боці
- D** Лежаче на лівому боці
- E** Лежаче на спині

58

Який дезінфікуючий розчин використовують для вологого прибирання у пологових будинках?

- A** \*0,2% розчин Бланідас
- B** 0,5% розчин мийного засобу
- C** 5% хлорного вапна
- D** 6% розчин перекису водню
- E** 10% хлорного вапна

59

У пацієнтки 37 років з порушенням менструального циклу акушеркою виявлені ознаки залізодефіцитної анемії. Вкажіть, які з перерахованих продуктів найбільш доцільно вживати.

- A** \* Яблука, гранати, печінку
- B** Картоплю, огірки, цибулю
- C** Ананаси, ківі, банани
- D** М'ясо, сало, вершки
- E** Буряк, картопля, моркву

60

Як часто потрібно проводити генеральне прибирання у палатах новонароджених пологового будинку?

- A** \*Через кожні 3 дні
- B** 1 раз на тиждень
- C** Кожен день
- D** 2 рази на тиждень
- E** Через кожні 5 днів

61

Як часто слід проводити генеральне прибирання у пологовому будинку в індивідуальних пологових залах?

- A** \*Щоразу після пологів
- B** 1 раз на тиждень
- C** 2 рази на тиждень
- D** 1 раз на 3 дні
- E** 2 рази на добу

62

Як часто слід проводити вологе прибирання палат у пологовому будинку?

- A** \* Не менше 2-х разів в день
- B** Щоденно
- C** По мірі необхідності
- D** 1 раз на тиждень
- E** 3 рази на тиждень

63

Вкажіть який розчин є протипоказаним для проведення санітарної обробки при педикульозі вагітних та дітей до 5 років.

- A** \*0,15% водно-емульсійний розчин карбофосу
- B** Мильно-порошкова емульсія
- C** 5% борна мазь + 0,25% емульсія дикрезилу + 10% розчин оцтової кислоти
- D** 4% розчин соди + 10% розчин оцтової кислоти
- E** 0,5% розчин метилацетафосу

64

Акушерка проводить предстерелізаційну очистку медичного інструментарію. Вкажіть, яку пробу повинна вона провести на залишки миючих засобів.

- A** \*Фенолфталеїнову
- B** Ортотолуїдинову
- C** Бензидинову
- D** Амідопиринову
- E** Азопірамову

65

Пацієнтці призначений загальний аналіз сечі. Вкажіть необхідну кількість сечі для даного дослідження.

- A** \*100-200 мл
- B** 5 -10 мл
- C** 15 - 20 мл
- D** 30 - 50 мл
- E** 50 -100 мл

66

Пацієнтці Н., призначено катетеризацію сечового міхура м'яким катетером. Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:

- A** \*Занесення інфекції у сечовивідні шляхи
- B** Гематурія
- C** Розрив уретри
- D** Обтурація сечовивідного каналу
- E** Поява алергійної реакції

67

Вкажіть найбільш доцільний метод стерилізації гумових катетерів багаторазового використання.

- A** \*Паровий метод
- B** Кип'ятіння
- C** Хімічний метод
- D** Повітряний метод
- E** Іонізуюче опромінення

68

Вкажіть температуру та час стерилізації медичного інструментарію в сухожаровій шафі.

- A** \*180<sup>0</sup> - 60 хв
- B** 180<sup>0</sup> - 55 хв
- C** 180<sup>0</sup> - 45 хв
- D** 160<sup>0</sup> - 50 хв
- E** 160<sup>0</sup> - 60 хв

69

Пацієнтці 50 р. лікар призначив лікувальну клізму з 50 мл обліпихової олії. Що потрібно зробити перед даною маніпуляцією?

- A** \*Очисну клізму
- B** Краплинну клізму
- C** Гіпертонічну клізму
- D** Сифонну клізму
- E** Олійну клізму

70

Пацієнтці призначено введення цефтріаксону по 300 000 ОД. У флаконі 500 000 ОД. Як виконати розведення антибіотика та скільки мл розчину набрати в шприц?

- A** \*ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 3 мл розчину
- B** ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 7 мл розчину
- C** ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 6 мл розчину
- D** ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 5 мл розчину
- E** ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 4 мл розчину

71

Назвіть розчин, який можна використати для розведення антибіотика для постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість:

- A** \*0,9% розчин натрію хлориду
- B** 0,25% розчин новокаїну
- C** 0,5% розчин новокаїну
- D** 2% розчин новокаїну
- E** 40% розчин глюкози

72

Пацієнтка з цукровим діабетом I типу тривалий час вводить собі інсулін тільки в зовнішню поверхню стегна. Яке ускладнення може виникнути?

- A** \*Ліподистрофія
- B** Алергічна реакція
- C** Некроз тканини
- D** Тромбофлебіт
- E** Інфільтрат

73

Після проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?

- A** \*Прокол обох стінок вени
- B** Алергічна реакція
- C** Ушкодження нервового стовбура
- D** Прокол м'язів
- E** Дуже щільно накладений джгут

74

Пацієнтка Р., через дві доби після проведеної операції скаржиться на біль в животі, здуття, не відходження газів. Яке втручання необхідно здійснити на даному етапі?

- A** \*Ввести газовідвідну трубку
- B** Ввести спазмолітики

- C* Покласти міхур з льодом на живіт
- D* Ввести знеболюючі
- E* Прикласти грілку

75

Вагітній, яка страждає на хронічний холецистит, призначено дієту № 5. Як акушерка повинна пояснити жінці та її родичам мету цієї дієти?

- A* \*Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення жовчовиділення
- B* Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності
- C* Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу
- D* Забезпечення фізіологічно повноцінного харчування
- E* Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин

76

При дослідженні пульсу у вагітної жінки, акушерка визначила, що частота пульсу складає 50 ударів за хвилину. Як оцінити таку частоту пульсу?

- A* \*Брадикардія
- B* Аритмія
- C* Тахікардія
- D* Пароксизмальна тахікардія
- E* Ниткоподібний

77

Пацієнтці, яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної дієти?

- A* \*Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу
- B* Нормалізація секретної та моторної функції кишечника
- C* Нормалізація обміну пуринів
- D* Зменшення набряків
- E* Покращення кровообігу

78

Акушерка проводить санітарну обробку вагітній жінці з педикульозом. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?

- A* \*5% борну мазь
- B* 0,15% водно-емульсійний р-н карбофосу
- C* 1% р-н хлораміну
- D* 5% р-н перманганату калію
- E* 3% р-н оцтової кислоти

79

Акушерка, здійснюючи догляд за породіллями, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?

- A* \*Дотримання тиші
- B* Прибирання приміщень
- C* Дієтичне харчування
- D* Виконання призначень лікаря
- E* Провітрювання палат

80

Якою повинна бути температура повітря у палатах полового відділення для породіль?

- A* \*21-22°C
- B* 14-16°C
- C* 16-18°C
- D* 27-29°C

**E** 30-32°C

81

Акушерка проводить контроль якості перед-стерилізаційної очистки інструментів. З якою метою вона проводить фенолфталеїнову пробу?

- A** \*Для виявлення залишків миючого засобу
- B** Для виявлення залишків крові
- C** Для виявлення дезінфікуючого засобу
- D** Для оцінки придатності інструментів до використання
- E** Для оцінки правильності проведення автоклавування

82

Внаслідок проведеної акушеркою внутрішньом'язевої ін'єкції породіллі у місці ін'єкції з'явилась сильна біль, яка віддає в стегновий і литковий м'яз. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?

- A** \*Ушкодження нервового стовбура
- B** Прокол м'язів
- C** Ушкодження окістя
- D** Прокол вени
- E** Утворення інфільтрату

83

Лікувальне харчування базується на трьох основних принципах. Що передбачає щадний режим харчування?

- A** \*Оберігання хворого органа чи системи органів від механічних, хімічних та термічних чинників.
- B** Базується на зменшенні чи збільшенні в харчовому раціоні того чи іншого продукту.
- C** У харчовий раціон вводять речовини, в яких організм відчуває нестачу.
- D** Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами.
- E** Дотримання режиму харчування

84

У приймальному відділенні пологового будинку в процесі приймання та санобробки у роділлі розпочалися потуги та виникла кровотеча. Які першочергові дії акушерки?

- A** \*Викликати чергового лікаря
- B** Поставити очисну клізму
- C** Зголити волосяний покрив із зовнішніх статевих органів
- D** Застосувати міхур з льодом
- E** Виміряти артеріальний тиск

85

У пологовому відділенні провели пологи у жінки 25 р. , яка хвора на СНІД. Яку дезінфекцію необхідно провести після виписування хворої?

- A** \*Заключну
- B** Профілактичну
- C** Поточну
- D** Вогнищеву
- E** Осередкову

86

Акушерка провела туалет породіллі зі швами на промежині. Який розчин використає акушерка для догляду за швами?

- A** \*1% розчин діамантового зеленого
- B** 70% розчин етилового спирту
- C** 2% розчин борної кислоти
- D** 5% розчин йоду

**E** 2% розчин натрію гідрокарбонату

87

Акушерка проводить санітарну обробку породіллі, зрізаючи нігті на руках і ногах. Нігтьові ложа обробила 5% розчином йоду.

Вкажіть, яку дезінфекцію ножиць повинна здійснити акушерка після використання?

- A** \*Занурити у 70% р-н етилового спирту на 6 год. з наступним промиванням проточною водою
- B** Занурити на 15 хв у 3% р-н пероксиду водню з наступним промиванням проточною водою
- C** Занурити в хлоргексидин на 45 хв з наступним промиванням проточною водою
- D** Занурити на 15 хв у 30° р-н етилового спирту з наступним промиванням проточною водою
- E** Занурити на 15 хв у 2% р-н соди з наступним промиванням проточною водою

88

Після ускладнених пологів акушерка за призначенням лікаря здійснює повторну катетеризацію сечового міхура. Який розчин використає акушерка з метою профілактики циститу у роділлі?

- A** \*10 мл теплого розчину фурациліну
- B** 5 мл р-ну калію перманганату
- C** 10 мл 70° етилового спирту
- D** 15 мл 2% р-ну натрію гідрокарбонату
- E** 10 мл 5% р-ну борної кислоти

89

Жінці 32 років, яка знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні було призначено в/м 5мл 5% р-ну кальцію глюконат. Під час повторного виконання процедури, жінка поскаржилась на різкий, пекучий біль. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика акушерки в даному випадку?

- A** \* Припинити ін'єкцію і перевірити етикетку ампули з—під ліків
- B** Ввести ліки і прикласти грілку
- C** Зробити йодну сітку на місці ін'єкції
- D** Місце ін'єкції обколоти 5% р-ном новокаїну
- E** Ввести ліки і виконати УФ-опромінення місця ін'єкції

90

В фельдшерсько-акушерський пункт звернулась жінка 25 років зі скаргами на біль, ущільнення в ділянці сідниць після курсу аутогемотерапії. Яке найбільш вірогідне ускладнення виникло?

- A** \* Інфільтрат
- B** Алергічна реакція
- C** Тромбофлебіт
- D** Абсцес
- E** Некроз тканини

91

Жінці 28 років, акушерка за призначенням лікаря ввела роділлі з нефропатією в/м 5мл 25% р-ну магнію сульфат. Що повинна далі зробити акушерка з використаним шприцом?

- A** \* Продезінфікувати, використовуючи правило двох ємкостей
- B** У зібраному вигляді опустити в дез. розчин
- C** Віддати старшій мед. сестрі
- D** Передати в ЦСВ
- E** Викинути в сміттєзбірник

Акушерка виконала породіллі за призначенням лікаря пробу на індивідуальну чутливість до антибіотика. Відповідний запис про негативний чи позитивний результат вона записує:

- A** \* У листку лікарських призначень
- B** На окремому аркуші
- C** У листку спостережень
- D** На титульну сторінку історії пологів
- E** В амбулаторній картці

93

Жінці 25 років, яка знаходиться в пологовому будинку із загрозою внутрішньоутробної асфіксії плода призначено в/в введення 40% р-ну глюкози + 5% р-н аскорбінової кислоти 10мл. Які вена найчастіше використовується для в/в ін'єкцій?

- A** \* Вени ліктьового згину
- B** Вени передпліччя
- C** Вени нижніх кінцівок
- D** Вени кістей
- E** Вени голови

94

Акушерка ввела породілля за призначенням лікаря в/м 5,0 мл баралгіна. Вказати, на який час повинна занурити акушерка використаний шприц в дезінфікуючий розчин.

- A** \* 60 хв.
- B** 40 хв.
- C** 15 хв.
- D** 20 хв.
- E** 30 хв.

95

Вагітній жінці, 31 року, яка хворіє на неспецифічний виразковий коліт, лікарем призначено аналіз калу на приховану кров. Які медикаменти потрібно виключити з призначень перед збиранням калу на приховану кров?

- A** \* Які містять йод, бром, залізо
- B** Які містять вітаміни групи В
- C** Які містять вісмут, кальцій
- D** Які містять кальцій, магній
- E** Які містять бром, йод

96

Жінці, 42 років, хворій на гострий аднексит лікарем-гінекологом було призначено в/м введення цефтріаксона по 1гр два рази на день. Перед введенням антибіотика акушеркою була проведена в/ш проба на чутливість до лікарського засобу. Через який час потрібно оцінити результат даної проби?

- A** \* Через 20 хв.
- B** Через 30 хв.
- C** Через 1 год.
- D** Через 3 год.
- E** Через добу

97

Акушерці під час забору крові на біохімічне дослідження кров потрапила у око. Які подальші дії акушерки?

- A** \* Промити око водопровідною водою
- B** Промити дистильованою водою
- C** Промити р-ном фурациліну 1:5000
- D** Промити перекисом водню
- E** Промити 5% р-ном калію перманганату



98

Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1 літру 3% розчину хлораміну?

- A** \* 30 гр
- B** 5 гр
- C** 10 гр
- D** 15 гр
- E** 100 гр

99

Яку максимальну кількість розчину можна вводити внутрішньом'язово одноразово?

- A** \* 10 мл
- B** 2 мл
- C** 5 мл
- D** 15 мл
- E** 20 мл

100

Який наказ МОЗ України передбачає профілактику розповсюдження СНІДу?

- A** \* Наказ №955
- B** Наказ №450
- C** Наказ №460
- D** Наказ №410
- E** Наказ №408

101

Яке положення слід надати пацієнту, у якого розвинувся набряк легень після чергової гіпертонічної кризи?

- A** \* Напівсидяче положення у ліжку
- B** Сидяче в кріслі
- C** Горизонтальне на спині
- D** З опущеним головним кінцем
- E** На провому боці в ліжку

102

Які дії передбачає знезараження шприців та голок після їх використання?

- A** \* Занурення в 0,2% розчин дезактину на 1 годину
- B** Занурення в 0,5% миючий розчин на 1 годину
- C** Занурення в 3% розчин перекису водню на 1 годину
- D** Занурення в 70% розчин етилового спирту на 1 годину
- E** Занурення в 96% розчин етилового спирту на 1 годину

103

При яких станах хворого застосування міхура з льодом протипоказане?

- A** \* I період гарячки
- B** Кровотеча
- C** II період гарячки
- D** Травми в перші години
- E** Після пологів в перші 2 години

104

Який термін часу затримки сечовиділення є показанням для катетеризації сечового міхура?

- A** \* 10 -12 годин
- B** 9 -15 годин
- C** 12 -18 годин

**D** 12 - 24 години

**E** 3 - 6 годин

105

У пацієнтки, 55 років під час об'єктивного обстеження виявлено дефіцит пульсу. Що входить в поняття дефіцит пульсу?

**A** \* Різниця між частотою серцевих скорочень та частотою пульсу

**B** Сума частоти серцевих скорочень та частоти пульсу

**C** Різниця між частотою пульсу та частотою серцевих скорочень

**D** Різниця між частотою пульсу та частотою дихання

**E** Сума частоти пульсу та частоти дихання

106

Яка дієта показана при захворюваннях серцево-судинної системи?

**A** \* Стіл №10

**B** Стіл №8

**C** Стіл №7

**D** Стіл №5

**E** Стіл №3

107

В приемном отделении родильного дома акушерка проводит обследование роженицы 28-ми лет, подсчитывает частоту дыхания. Какой должна быть в норме частота дыхания?

**A** \*16-20 в минуту

**B** 10-12 в минуту

**C** 12-16 в минуту

**D** 20-24 в минуту

**E** 24-28 в минуту

108

В послеродовой палате акушерка проводит исследование пульса у роженицы, 23 лет. Какие характеристики пульса она должна определить?

**A** \*Ритм, частота, наполнение, напряжение

**B** Частота, высота, наполнение

**C** Величина, наполнение, напряжение

**D** Ритм, скорость, высота

**E** Напряжение, скорость, величина

109

В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 32 лет, с диагнозом хронический пиелонефрит. Лечащий врач назначил исследование мочи по Зимницкому. Как часто на протяжении суток нужно собирать мочу у пациентки?

**A** \*Каждые 3 часа

**B** Каждые 2 часа

**C** Каждые 4 часа

**D** Каждые 6 часов

**E** Каждые 8 часов

110

В послеоперационной палате находится пациентка, 27 лет после операции кесарева сечения. Ей назначен постельный режим. Медсестра проводит мероприятия по профилактике пролежней. Какой раствор она должна использовать для обработки кожи в местах возможного образования пролежней?

**A** \*10% раствор камфорного спирта

**B** 1% раствор калия перманганата

**C** 3% раствор перекиси водорода

- D** 2% раствор гидрокарбоната натрия
- E** 1:5000 раствор фурацилина

111

В отделении патологии беременных находится пациентка, 32 лет, страдающая митральным пороком сердца, хронической недостаточностью кровообращения. Лечащий врач назначил контроль водного баланса. Что следует учитывать, выполняя данное назначение?

- A** \*Соотношение введенной в организм жидкости и суточного диуреза
- B** Соотношение дневного и ночного диуреза
- C** Количество введенной в организм жидкости за сутки
- D** Суточное количество мочи
- E** Разницу между утренними и вечерними показателями массы тела

112

В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 30 лет, с диагнозом язвенная болезнь. Лечащий врач назначил анализ кала на скрытую кровь. Какую диету должна соблюдать пациентка в течении 3-х дней?

- A** \*Безгемоглобиновую
- B** С ограничением соли
- C** Бесшлаковую
- D** Калийсберегающую
- E** С ограничением жидкости

113

В гинекологическом отделении находится на обследовании пациентка, 32 лет, которая имеет сопутствующий диагноз хронический колит. В связи с наличием запора, лечащий врач назначил очистительную клизму. Какое положение должна занять пациентка при проведении манипуляции?

- A** \*На левом боку
- B** На правом боку
- C** На животе
- D** На спине
- E** Коленно-локтевое

114

В отделении патологии беременных находится пациентка, 28 лет, страдающая хроническим холециститом. По назначению врача ей проводят 3-х фазное дуоденальное зондирование. Медсестра зондового кабинета получила первую порцию желчи, затем ввела в зонд 50 мл теплого раствора 33% раствора сульфата магния, наложила зажим на зонд на 10 минут, а затем из зонда стала выделяться вязкая жидкость темно-оливкового цвета. Как называется эта порция?

- A** \*Пузырная желчь
- B** Дуоденальная желчь
- C** Желчь из внутривеночных протоков
- D** Панкреатический сок
- E** Желудочный сок

115

В отделении патологии беременных находится пациентка, 25 лет, с диагнозом сахарный диабет I типа. Медсестра процедурного кабинета готовит пациентке инъекцию инсулина. Сколько мл инсулина она должна набрать в шприц емкостью 2 мл, если назначена доза 16 ЕД (1 мл инсулина - 40 ЕД)?

- A** \*0,4 мл
- B** 0,6 мл
- C** 0,5 мл
- D** 0,3 мл

**E** 0,2 мл

116

Акушерка родильного зала в начале рабочего дня вскрыла стерильный бикс с перевязочным материалом. В течении какого времени можно использовать материалы из данного бикса ?

- A** \*24 часов
- B** 48 часов
- C** 12 часов
- D** 10 часов
- E** 6 часов

117

В отделении патологии беременных медсестра процедурного кабинета утром взяла кровь из вены у 3-х пациенток на ВИЧ-инфекцию. Какой приказ МЗ Украины требует доставки пробирок с кровью в закрытых контейнерах?

- A** \*№ 955
- B** № 408
- C** № 228
- D** № 59
- E** № 38

118

Укажите время стерилизации в автоклаве под давлением 2 атм, T – 132<sup>0</sup>C.

- A** \*20 мин
- B** 15 мин
- C** 45 мин
- D** 60 мин
- E** 120 мин

119

После резкого понижения температуры тела у больной возник коллапс. Необходимо срочно придать правильное положение:

- A** \*Горизонтальное с опущенным головным концом
- B** Возвышенное положение
- C** Положение на животе
- D** Положение на правом боку
- E** Положение Симса

120

Больной в состоянии гипоксии назначена ингаляция кислородом. Увлажнение кислорода необходимо провести:

- A** \*Водой
- B** Изотоническим раствором
- C** Отваром ромашки
- D** 0,5% раствором перекиси водорода
- E** 70% этиловым спиртом