

1

У пацієнта Ф., 34 років спостерігається загальна слабкість, запаморочення, шум у вухах, нудота, блювання, блідість шкірних покривів, сповільнення пульсу, зниження артеріального тиску, порушення свідомості. Для якого стану це характерно?

- A** *Колапсі
- B** набряку легень
- C** інфаркті міокарда
- D** кардіогенному шоці
- E** серцевій астмі

2

На яку глибину потрібно притиснути грудину до хребта виконуючи непрямий масаж серця у дорослих:

- A** *4-5 см
- B** 1-2 см
- C** 3-4 см
- D** 2-3 см
- E** 5-6 см

3

Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні серцево-легеневої реанімації:

- A** *2 вдихи – 30 компресій
- B** 5 вдихів – 2 компресії
- C** 1 вдих – 5 компресій
- D** 15 вдихів – 2 компресії
- E** 10 вдихів – 5 компресій

4

Скільки часу проводиться серцево-легенева реанімація?

- A** *30-40 хвилин
- B** До 5 хвилин
- C** До 35 хвилин
- D** До 1 години
- E** 20 хвилин

5

Дефібриляцію серця проводять:

- A** *До тих пір доки на ЕКГ реєструється фібриляція
- B** 3-5 разів
- C** Не більше 10 разів
- D** Не довше, ніж протягом 1 години
- E** До тих пір, поки на ЕКГ реєструється асистолія

6

На місці дорожньо - транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання, пульс та артеріальний тиск не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?

- A** *Клінічна смерть
- B** Передагональний стан
- C** Агонія
- D** Колапс
- E** Травматичний шок

7

При огляді пацієнта з наявністю ознак клінічної смерті ви починаєте серцево – легеневу реанімацію. Яке співвідношення вдохів та натискань на грудину при проведенні серцево-легеневої реанімації?

- A** *2:30
- B** 2:5
- C** 3:5
- D** 2:15
- E** 10:15

8

На ФАП доставили потерпілого після ДТП. При огляді: без свідомості, зіниці розширені, відсутній пульс на сонних артеріях та самостійне дихання. Що необхідно зробити в першу чергу:

- A** негайно розпочати СЛР
- B** Зняти ЕКГ
- C** Виміряти АТ
- D** Транспортувати у ВАІТ
- E** Покликати на допомогу лікаря

9

Яка Ваша першочергова дія, якщо потерпілого витягли з води через 5 хвилин після утоплення? В нього відсутні пульс на сонній артерії і самостійне дихання.

- A** Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B** Викликати міліцію
- C** Ввести в/в 1 мл 0,05% розчину строфантину
- D** Викликати ШМД
- E** Нічого не робити, бо є ознаки смерті

10

Відбулися перші термінові стрімкі пологи на дому. Народився живий доношений хлопчик масою 3220 г, довжиною 50 см, без дихання. ЧСС 40/хв. Ціаноз шкіри. Рухи дитини відсутні. Атонія м'язів. Яка невідкладна допомога?

- A** *ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно – адреналін.
- B** Закритий масаж серця, внутрішньовенно гідрокарбонат натрію.
- C** ШВЛ, внутрішньовенно глюкозу, адреналін, гідрокарбонат натрію.
- D** ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно – глюкозу
- E** Закритий масаж серця, внутрішньовенно – адреналін, глюкоза.

11

У потерпілого К. 19 років констатована клінічна смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?

- A** *Пульсація на сонній артерії
- B** Пасивні рухи грудної клітки
- C** Зниження температури тіла
- D** Відсутність свідомості
- E** Розширені зіниці

12

Пацієнт К., 32 роки, скаржиться на напади ядухи з утрудненим видиханням. Наприкінці нападу тяжко відходить невелика кількість склистого мокротиння. Найімовірніший діагноз:

- A** *Астматичний статус
- B** Гемічна гіпоксія
- C** Серцева астма
- D** Гострий бронхіт
- E** Пневмонія

13

Проводячи реанімаційні заходи протягом 15 хв., ви відзначили звуження зіниць, порожівіння шкіри, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного дихання. Які ваші подальші дії?

- A** *Продовжувати реанімаційні заходи
- B** Припинити реанімацію
- C** Замінити метод "рот до рота" на ручні методи
- D** Припинити ШВЛ, продовжити масаж серця
- E** Припинити реанімаційні заходи до повторного розширення зіниць

14

Виберіть метод виведення отрути з шлунково-кишкового тракту в умовах ФАПУ:

- A** * Промивання шлунку
- B** Гемодіаліз
- C** Гемосорбція
- D** Плазмаферез
- E** Форсований діурез

15

В разі отруєння якою речовиною антидотом є етиловий спирт:

- A** * Метиловим спиртом
- B** Фосфоро-органічною речовиною
- C** Кислотами
- D** Лугами
- E** Грибами

16

Акушерка ФАПУ дагностувала клінічну смерть. Для звільнення верхніх дихальних шляхів у разі западання язика акушерка використовує потрійний прийом Сафара. Який із зазначених моментів відноситься до цього прийому?

- A** *Вивести нижню щелепу
- B** Повернути голову на бік
- C** Закрити ніс
- D** Використати язикотримач
- E** Ввести повітровод

17

При гострому отруєнні фосфорорганічними речовинами, який треба використати антидот:

- A** * Атропін
- B** Унітіол
- C** Ліпоеву кислоту
- D** Налоксон
- E** Етиловий спирт

18

У хворої після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворої важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії акушерки?

- A** * Обколоти 0,1% адреналіном
- B** Ввести еуфілін
- C** Ввести 20% розчин кофеїну
- D** Покласти грілку
- E** Ввести строфантин

19

У пацієнтки Р, 43 р. Через 20 хвилин після введення 32 Од інсуліну виникла загальна слабкість, пітливість, тремтіння кінцівок, серцебиття. Це характерно для:

- A** * Стану гіпоглікемії
- B** Печінкової коми
- C** Гіперглікемічної коми
- D** Гіперосмолярної коми
- E** Гіперлактацедемічної коми

20

Во время приема пищи у пациента К., 28-ми лет, внезапно возникла инспираторная одышка, приступообразный кашель, цианоз лица, осиплость голоса, пострадавший возбужден, судорожно обхватывает руками шею. Какое мероприятие неотложной помощи необходимо выполнить?

- A** * Прием Геймлиха
- B** Постуральный дренаж
- C** ИВЛ
- D** Тройной метод Сафара
- E** Трахеостомия

21

У пациента А. 67-ми лет, после физической нагрузки возникла сильная боль за грудиной с иррадиацией в левую руку. Боль длится более 30мин и не купируется нитроглицерином. На ЭКГ – дуга Парди. Ваш диагноз?

- A** * Острый инфаркт миокарда
- B** Стенокардия напряжения
- C** Кардиогенный шок
- D** Острая левожелудочковая недостаточность
- E** Острая правожелудочковая недостаточность

22

Через какой промежуток времени следует проводить контроль реанимационных действий?

- A** * 2 минуты
- B** 5 минут
- C** 7 минут
- D** 10 минут
- E** 1 минуту

23

Какова клиническая картина отравления метанолом или “техническим спиртом”?

- A** * Двоение в глазах
- B** Слюнотечение
- C** Дисфагия
- D** Дизурия
- E** Диспепсия

24

Після інтубації трахеї та переведення пацієнта на апаратну ШВЛ медсестра - анестезистка зауважила відставання в акті дихання лівої половини грудної клітки. В даному випадку кінець інтубаційної трубки розміщений в:

- A** * Правому головному бронху
- B** Лівому головному бронху
- C** Проміжному бронху
- D** Бронху нижньої частки справа

25

Ви акушерка ФАПу. Вас викликали до пацієнтки Н., 32 років з цукровим діабетом I типу, в якої з'явилась нудота, блювання, біль в животі, сонливість. Об'єктивно: Р – 125/хв., АТ – 80/45 мм.рт.ст., шкіра суха. Дихання Куссмауля. Язик сухий. Запах ацетону з рота.

Поставте найімовірніший діагноз:

- A* *Кетоацидотична кома
- B* Анафілактичний шок
- C* Гіпоглікемічна кома
- D* Непритомність
- E* Гіперосмолярна кома

26

Потерпілого витягли з води через 4 хвилини після утоплення. Об'єктивно: шкіра бліда, дихання відсутнє, зіниці розширені, не реагують на світло. Вкажіть місце, де необхідно перевірити пульс.

- A* *На сонних артеріях
- B* На ліктьових артеріях
- C* На підколінних артеріях
- D* На черевній аорті
- E* На променевих артеріях

27

Електрик отримав удар електричним струмом 2 хвилини тому. Пацієнт без свідомості, дихання відсутнє, пульс на сонній артерії не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Вкажіть першочергові дії медичного працівника.

- A* *Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B* Дати понюхати ватну кульку, змочену нашатирним спиртом
- C* Розпочати непрямий масаж серця
- D* Розпочати штучну вентиляцію легень
- E* Чекати на прибуття реанімаційної бригади

28

У пацієнтки 30 р. шлункова кровотеча. Призначено переливання крові А(II) групи, Rh – негативний в кількості 2 літрів. Вкажіть препарат, який необхідно ввести для профілактики цитратного шоку.

- A* *10% розчин кальцію хлориду
- B* 1% розчин кальцію хлориду
- C* 5% розчин глюкози
- D* 1% розчин димедролу
- E* 50% розчин анальгіну

29

Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні реанімаційних заходів у дитини 16 років?

- A* *2 вдихи – 30 компресій
- B* 2 вдихи – 40 компресій
- C* 4 вдихи – 20 компресій
- D* 3 вдихи – 15 компресій
- E* 3 вдихи – 20 компресій

30

У чоловіка під час їжі раптово виник сильний кашель, ядуха, наростав ціаноз. Дружина почала постукувати у міжлопатковій ділянці, виконала прийом Геймліха, але через 3 хв. чоловік втратив свідомість, розвинулись судоми. Які наступні заходи потрібно провести?

- A** * Конікотомію
- B** Трахеостомію
- C** Інтубацію трахеї
- D** Доступ свіжого повітря
- E** Масаж грудної клітки