

1

Пацієнтка, 29 років, страждає патологічною тягою до алкогольних напоїв. 2 дні тому востаннє приймала алкоголь. Вночі погано спала, "бачила" в кімнаті на стінах павутину, стала тривожною, відкривши очі побачила біля себе незнайомого чоловіка, але придивившись, зрозумів, що це пальто на вішаку. Який препарат слід порекомендувати з метою профілактики розвитку делірію?

- A** Суміш Попова
- B** галоперидол
- C** аміназин
- D** димедрол
- E** корвалол

2

Через 6 місяців після пологів у жінки 22 р. з'явилися скарги на імперативні позиви до сечовипускання, затерпання та тяжкість в ногах. 2 роки тому у неї був випадок раптової втрати зору на праве око, яка після лікування в очному відділенні повністю пройшла. Для якого захворювання є типовими дані скарги?

- A** Розсіяного склерозу
- B** Пухлини головного мозку
- C** Ішемічного інсульту
- D** Поліомієліту
- E** Летаргічного енцефаліту

3

У дитини 2 р. відмічається підвищення м'язового тону та рефлексів на нижніх кінцівках. Під час ходи спирається на пальці, перехрещує гомілки. Є дані про патологічний перебіг вагітності та пологів у матері, відставання дитини в психомоторному розвитку з перших місяців життя. Про яке захворювання можна думати?

- A** Дитячий церебральний параліч
- B** Пухлина мозку
- C** Хвороба Дауна
- D** Енцефаліт
- E** Акушерський параліч

4

У породіллі після пологів, розвинувся післяпологовий психоз. Вона постійно сумна, задумана, відмовляється від їжі, лежить в ліжку, відвернувшись до стіни. Яку загрозу для життя пацієнтки Ви повинні запідозрити?

- A** *Суїцидальні думки і дії
- B** Розвиток гіпостатичної пневмонії
- C** Авітаміноз
- D** Схуднення
- E** Виникнення пролежнів

5

У породіллі після пологів розвинувся післяпологовий психоз. Вона була постійно сумна, задумана, відмовлялася від їди, лежала у ліжку, відвернувшись до стіни. Після проведеного лікування стан покращився. Проведіть оцінку успішних результатів втручань:

- A** *Зникнення депресії
- B** Нормалізація температури
- C** Нормалізація стільця
- D** Нормалізація серцево-судинної системи
- E** Покращання апетиту

6

Вагітна 27 р, після тривалого перебування на холоді скаржиться на неможливість закрити ліве око, сльозотечу з нього, порушення слуху, порушення смаку. Який симптом необхідно перевірити?

- A** *Симптом "вітрила"
- B** Симптом Кернега
- C** Ригідність потиличних м'язів
- D** Симптом Бабинського
- E** Симптом Пастернацького

7

Після пологів у новонародженого шкірні покриви ціанотичні, дихання нерегулярне, поверхневе, знижена реакція на зовнішні подразники, безумовні рефлекси пригнічені. Діагностована гіпоксія. При лікуванні гіпоксії у новонароджених важливо, насамперед:

- A** *Ліквідувати кисневе голодування головного мозку
- B** Очистити кишківник
- C** Зігріти новонародженого
- D** Налагодити нормальне харчування
- E** Очистити шкірні покриви

8

У вагітної, хворої на епілепсію, після самостійного припинення прийому протисудомних препаратів виник великий судомний напад. Які найбільш доцільні дії в цьому випадку?

- A** Надати допомогу при нападі і викликати лікаря
- B** Ввести протисудомний препарат
- C** Викликати лікаря
- D** Дати заспокійливі препарати
- E** -

9

Акушерка була викликана до породіллі, яка проявляє гнівливість, агресію. По відношенню до дитини байдужа, не реагує на її крик. Періодично говорить про заподіяння шкоди дитині. Які першочергові дії акушерки?

- A** Негайно викликати лікаря
- B** Перевести породіллю з дитиною в окрему палату
- C** Самостійно дати заспокійливі препарати
- D** Провести бесіду з породіллею про необхідність турботи про дитину
- E** Спостерігати за породіллею

10

Пацієнтка, 65 років, хворіє на гіпертонію. Дві доби тому перенесла гостре порушення мозкового кровообігу. Який сучасний додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- A** Магнітнорезонансна комп'ютерна томографія
- B** Реоенцефалографія
- C** Спинномозкова пункція
- D** Ехоенцефалографія
- E** Рентгенографію черепа в 2 - х проекціях

11

Пацієнтка скаржиться на біль в ділянці попереку, який віддає в праву ногу та посилюється при рухах. Хворіє довгий час. Які особливості догляду за пацієнткою?

- A** Необхідно щит на ліжку
- B** Покласти хвору на живіт
- C** Покласти на правий бік
- D** Покласти на лівий бік
- E** Під поперек покласти, щось м'яке

12

У вагітної жінки протягом доби виникають багаторазові судомні напади один за одним. Свідомість пацієнтки між нападами не відновлюється. Про який діагноз можна думати?

- A** Епілептичний стан
- B** Епілептичний напад
- C** Істеричний напад
- D** Малий епілептичний напад
- E** Епілепсія Джексона

13

У пацієнтки - розщеплення психічних процесів, зниження активності, згасання емоцій, аутизм, негативізм і прояви апатико-абулічного синдрому. Для якого захворювання характерні такі симптоми ?

- A** *Шизофренії
- B** Маніакально-депресивного психозу
- C** Істерії
- D** Інволюційних психозів
- E** Епілепсії

14

У пацієнтки виявлено підвищення t° до 39°C , відсутність активних рухів в нижніх кінцівках, трофічні розлади на сідницях, порушення функції тазових органів по типу гострої затримки сечі. Для якого ураження характерні ці симптоми ?

- A** *Для ураження спинного мозку
- B** Для ураження головного мозку
- C** Для ураження мозкових оболонок
- D** Для ураження головного та спинного мозку
- E** Для ураження периферичних нервів

15

Машина швидкої допомоги доставила пацієнта в приймальне відділення лікарні з вулиці. Анамнез невідомий. При огляді: шкірні покрови багрового кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, ліві кінцівки нерухомі. Дихання шумне, АТ 195/110 мм рт.ст. Яке захворювання можна запідозрити ?

- A** *Геморагічний інсульт
- B** Менінгіт
- C** Ішемічний інсульт
- D** Епілептичний напад
- E** Істеричний напад

16

Пацієнтка скаржиться на перекосяч обличчя, ліве око не закривається, ліва брова нерухома, їжа виливається через лівий кут рота. Який нерв уражений у пацієнтки?

- A** *Лицьовий
- B** Трійчастий
- C** Верхньощелепний
- D** Потиличний
- E** Очний

17

У хворої на епілепсію безпричинно з'явилися: незадоволення собою, оточуючими, дратівливість, похмурість. Про яку патологію емоцій можна подумати?

- A** *Дисфорія
- B** Депресія
- C** Апатія

- D** Ейфорія
- E** Слабодухість

18

Пацієнтка на третій день після пологів почала себе дивно поводити: сміялась без

причини, намагалась покинути відділення, пояснюючи терміновими справами, зустрічю з "великими" людьми. Яку патологію може запідозрити акушерка?

- A** *Післяпологовий психоз
- B** Інфекційний делірій
- C** Депресивну фазу маніакально-депресивного психозу
- D** Кататонічна форма шизофренії
- E** Клімактеричний невроз

19

У пацієнтки 36 р., яка 2 дні тому перенесла травму голови з короткочасною втратою

свідомості, наростає головний біль, нудота, слабкість в лівій половині тіла. Об'єктивно: зіниці S<D, тонус м'язів зліва вищий, сухожилкові рефлекси S<D, симптом Бабінського зліва (+). Який попередній діагноз?

- A** *Стиснення мозку внутрішньочерепною гематомою
- B** Контузія головного мозку III ст.
- C** Струс головного мозку
- D** Контузія головного мозку I ст.
- E** Розрив спинного мозку.

20

Акушерку ФАПу викликали до пацієнтки 50 р., яка знаходиться на диспансерному обліку з приводу гіпертонічної хвороби. Прокинувшись вночі, хвора не змогла встати з ліжка через слабкість в правих кінцівках, втратила мову. Виявлено підвищення АТ до 190/110 мм рт.ст. Які медикаменти необхідно застосувати в першу чергу?

- A** *Гіпотензивні
- B** Седативні
- C** Антихолінергічні
- D** Нейролептики
- E** Антикоагулянти

21

Пацієнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Яке діагностичне обстеження необхідно провести?

- A** * Спинно-мозкову пункцію
- B** Біохімічний аналіз крові
- C** Бактеріологічне дослідження калу
- D** Загальний аналіз крові
- E** Загальний аналіз сечі

22

Пацієнтка не може стати на повну стопу, ходить на пальцях. Про яке захворювання можна думати?

- A** * Неврит великогомілкового нерва
- B** Неврит малогомілкового нерва
- C** Параліч кінцівки
- D** Істерія
- E** Негативізм

23

После родов с использованием акушерских щипцов у новорожденного правая ручка пассивно свисает вдоль туловища, спонтанные движения в руке отсутствуют. Сухожильные рефлексy не вызываются. Кожа бледная, рука холодная на ощупь. Поставлен диагноз: тотальный акушерский паралич. Причиной данного состояния является?

- A** *Поражение плечевого сплетения
- B** Поражение крестового сплетения
- C** Поражение поясничного утолщения
- D** Поражение межреберных нервов
- E** Поражение конского хвоста

24

У женщины со сроком беременности 10 недель подозревается опухоль мозга. Какое исследование необходимо провести для выявления опухоли?

- A** *МРТ головного мозга
- B** Исследование спинномозговой жидкости
- C** Электроэнцефалографию
- D** Рентгенографию органов грудной клетки
- E** Рентгенографию черепа

25

Пацієнтка на прийомі у лікаря втратила свідомість. З'явилися тонічні судоми, котрі через декілька секунд змінились клонічними. Дихання стало хриплим, з рота виділяється піна, спостерігається самовільне сечовиділення. Приступ тривав 3 хв. Яку патологію можна запідозрити?

- A** Великий епілептичний напад
- B** Малий епілептичний напад
- C** Істеричний напад
- D** Присмериковий стан
- E** Транс

26

У пацієнтки 32 р., раптово виник головний біль, нудота, блювота, втрата свідомості. Об'єктивно: АТ 190/130 мм. рт. ст., пульс 94/хв., напружений, шкіра гіперемована. Сопор. На запитання відповідає односкладно. Позитивні менінгеальні знаки. Ліквор кров'янистий. Встановіть попередній діагноз.

- A** *субарахноїдальний крововилив
- B** ішемічний інсульт
- C** енцефаліт
- D** емболія судин головного мозку
- E** менінгіт

27

7-річний хлопчик - неуважний в класі. Вчитель звернув увагу на періодично відсутній погляд дитини і прицмокування губами. Падіння і судом не відмічалось. Під час короткої "відсутності" (1-2 секунди) не відкликався на своє ім'я. Який імовірний тип нападу?

- A** *малий епілептичний
- B** генералізований тоніко-клонічний
- C** парціальний
- D** епістатус
- E** джексоновський

28

У пацієнтки 40 р., після фізичного навантаження виник біль у поперековій ділянці з іррадіацією по задній поверхні лівої ноги. Об'єктивно: сколіоз поперекового відділу, напруження м'язів спини. Назвіть симптом натягу, який необхідно перевірити при обстеженні.

- A** *Ласега
- B** Керніга
- C** Брудзинського
- D** Бабинського
- E** Россолімо

29

У пацієнтки 40 р., в маніпуляційному кабінеті виник великий епілептичний напад. Вкажіть захід, що є необхідним при наданні долікарської допомоги.

- A** *Запобігти травматизації голови, язика
- B** Міцно притиснути кінцівки
- C** Намагатися привести до свідомості
- D** Вкрити теплою ковдрою
- E** Протерти обличчя холодною водою

30

Після пологів у пацієнтки розвинулись: звисаюча стопа, гіпотрофія та гіпотонія м'язів передньо-зовнішньої поверхні гомілки, порушення поверхневих видів чутливості на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Ураження якого нерва можна запідозрити?

- A** * Малогомілкового
- B** Великогомілкового
- C** Крижове сплетіння
- D** Стегнового
- E** Сідничного